

DIOGAM 600 mg

Diosmine

Comprimé pelliculé sécable

CE QUE CONTIENT DIOGAM 600 mg, comprimé pelliculé sécable :

La substance active est la diosmine (600 mg). Les autres composants sont : lactose monohydraté, cellulose microcristalline, povidone K 25, carboxyméthylamidon sodique (type A), silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium.

Pelliculage : OPADRY II 31F34851 (lactose monohydraté, hyproméllose, dioxyde de titane, macrogol 4000, oxyde de fer rouge, oxyde de fer noir, ponceau 4R E124).

QU'EST-CE QUE DIOGAM 600 mg, comprimé pelliculé sécable, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Comprimé pelliculé sécable. Boîte de 30 comprimés pelliculés sécables.

VASCULOPROTECTEUR / MÉDICAMENT AGISSANT SUR LES CAPILLAIRES.

Ce médicament est un veinotonique (il augmente la tonicité des parois veineuses) et un vasculoprotecteur (il augmente la résistance des petits vaisseaux sanguins).

Il est préconisé dans :

- Les troubles de la circulation veineuse (jambes lourdes, douleurs, sensations pénibles dites impatiences lors du coucher).

• La crise hémorroïdaire.

INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DIOGAM 600 mg, comprimé pelliculé sécable.

Ne pas prendre DIOGAM 600 mg, comprimé pelliculé sécable dans le cas suivant :

Ce médicament est généralement déconseillé pendant l'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prendre des précautions particulières avec DIOGAM 600 mg, comprimé pelliculé sécable dans les cas suivants :

- En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).
- Si la gêne et la fragilité des vaisseaux ne diminuent pas en 15 jours, consultez votre médecin.
- Si les troubles hémorroïdaires persistent après quelques jours de traitement, il est indispensable de consulter votre médecin.
- Ce médicament a toute son efficacité lorsqu'il est associé à une bonne hygiène de vie. Eviter l'exposition au soleil, la chaleur, la station debout prolongée, l'excès de poids. La marche à pied et éventuellement, le port de bas adaptés favorisent la circulation sanguine.

Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin, car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

En l'absence de données sur le passage dans le lait maternel, le traitement est déconseillé pendant la période d'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notable

Lactose, ponceau.

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.
COMMENT PRENDRE DIOGAM 600 mg, comprimé pelliculé sécable ?

• Troubles de la circulation : 1 comprimé par jour, le matin avant le petit déjeuner.

• Hémorroïdes : 2 à 3 comprimés par jour, au moment des repas.

Si vous avez l'impression que l'effet de DIOGAM 600 mg, comprimé pelliculé sécable est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Voie orale.

Prendre le comprimé avec un demi-verre d'eau.

Les comprimés doivent être pris au moment des repas.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Si vous avez pris plus de DIOGAM 600 mg, comprimé pelliculé sécable que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre DIOGAM 600 mg, comprimé pelliculé sécable :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre;

QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, DIOGAM 600 mg, comprimé pelliculé sécable est susceptible d'avoir des effets indésirables :

- Possibilité de troubles digestifs mineurs entraînant rarement l'arrêt du traitement.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement au centre national de pharmacovigilance - Site web : www.pharmacovigilance.rns.tn ou directement au fabricant de ce médicament via l'adresse mail : pharmacovigilance@pharmaghreb.com. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

COMMENT CONSERVER DIOGAM 600 mg, comprimé pelliculé sécable ?

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE : Juin 2023

AMM N°: 901.350.2

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ces contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas la dose sans consulter votre médecin.

NE LAISSEZ JAMAIS LES MEDICAMENTS A LA PORTEE DES ENFANTS

vs n°2/ANT10583-B



Fabriqué et distribué par les laboratoires PHARMAGREB
BP 7 - 1080 Cedex TUNIS - Tél. : +216 71 94 03 00 - Fax : +216 71 94 03 09



ديوقام 600 مغ

ديوسمين

قرص مغلف قابل للتجزئة

- استشيري طيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.
- قائمة السواغ ذو مفعول جهير**
- لاكتوز، بونسو.
- استعمال أدوية أخرى**
- الرجاء إعلام طيبك أو الصيدلي إذا كنت تستعملين أو استعملت مؤخرًا دواء آخر، حتى وإن تلقى الأمر دواء مقتنى بدون وصفة طبية.
- كيف يتم تناول ديوقام 600 مغ، قرص مغلف قابل للتجزئة؟**
- اضطرابات الدوران : 1 قرص في اليوم، في الصباح قبل الإفطار.
 - البواسير : 2 إلى 3 أقراص في اليوم، أثناء الأكل.
 - استشر طيبك أو الصيدلي إذا شعرت بأن مفعول ديوقام 600 مغ، قرص مغلف قابل للتجزئة هو ضعيف جداً.
 - عن طريق الفم.
 - تناول القرص مع نصف كأس من الماء.
 - يجب تناول الأقراص مع وجة الطعام.
 - يجب الامتناع بدقة لوصف طيبك في جميع الحالات.
- إذا تناولت كمية تفوق الكمية المحددة لـ ديوقام 600 مغ، قرص مغلف قابل للتجزئة ،**
- استشر حالاً طيبك أو الصيدلي.
- إذا تناولت من تناول ديوقام 600 مغ، قرص مغلف قابل للتجزئة ،**
- لا تأخذ حرجمة مضاعفة لتعميق الحرجية التي نسبت تناولها.
- ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها الممكنة؟**
- كل الأدوية ديوقام 600 مغ، قرص مغلف قابل للتجزئة قد يتسبب في حدوث تأثيرات غير مرغوب فيها :
- إمكانية اضطرابات هضمية صفيرة تتوجّب نادراً إيقاف العلاج.
 - الإبلاغ عن التأثيرات غير المرغوب فيها
- إذا لاحظت وجود تأثير غير مرغوب فيه من بين التأثيرات السالفة ذكرها أو لغير تأثيرات أخرى غير مرغوب فيها، غير مذكورة في هذه النشرة، فم يإعلام طيبك أو الصيدلي فوراً. يمكنك أيضاً الإبلاغ عن التأثيرات غير المرغوب فيها مباشرة إلى المركز الوطني للقيقة الدوائية - موقع واب : www.pharmacovigilance.rns.tn أو مباشرة إلى مصنع هذا الدواء عن طريق البريد الإلكتروني - عنوان البريد الإلكتروني :
- pharmacovigilance@pharmaghreb.com
- عن طريق الإبلاغ عن التأثيرات غير المرغوب فيها، يمكنك المساعدة في توفير المزيد من المعلومات حول السلامة عند استعمال هذا الدواء.
- كيف يحفظ ديوقام 600 مغ، قرص مغلف قابل للتجزئة؟**
- لا توجد احتياطات خاصة لحفظه.
- يحفظ بعيداً عن مرأوي ومتناول الأطفال.
- لا يُستعمل بعد تاريخ الأقصى المسجل على العلبة.

تاریخ مراجعة النشرة : جوان 2023
رقم الترخيص : 901 350 2

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كفراش من المستحضرات.
- الدواء مستحضر يؤثر على مستحلبك واستهلاكه خلاها للتعليمات بعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتليمي الصيدلاني الذي صرفها لك.
- اتبع نصائح الصيدلاني.
- فالطيب والصيدلاني هما الخبريان بالدواء وبنفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تقاء نفسك.
- لاتند ولاتزد علىها بدون استشارة الطبيب.

لاتترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

يحتوي ديوقام 600 مغ، قرص مغلف قابل للتجزئة، على :

المادة الفعالة هي ديوسمين (600) مغ.

بقية المكونات: لاكتوز أحادي مائي، سيلوز ميكروكريستالي، بونسو K25، كربوكسي مثيل النشا الصودي (نوع A)، سيليكا غروباتي لامائي، سيارات المغنزيوم.

الغلاف : أوديراي II 31F34851 (لاكتوز أحادي مائي، هيبرومولون، ثاني أكسيد النيتان، مكروقول 4000، أحمر أكسيد الحديد، أسود أكسيد الحديد، بونسو 4R E124).

ما هو ديوقام 600 مغ، قرص مغلف قابل للتجزئة، وفي أي حالة يستعمل؟

قرص مغلف قابل للتجزئة .

عليه تحتوي على 30 قرص مغلف قابل للتجزئة.

حامى الوعاء / دواء فعال على الشعيرات.

هذا الدواء يحتوى على الأوردة (يزيد في توسيع جدار الوريد) وحامى الوعاء (يزيد في سلامة الأوردة الصغيرة).

يتصفح بإستعماله في :

• اضطرابات الدوران الوريدي (تشنج الأرجل، أوجاع، أحاسيس عسيرة تسمى بالأرجل التعبة عند النوم).

• ثانية البواسير.

معلومات ضرورية قبل استعمال ديوقام 600 مغ، قرص مغلف قابل للتجزئة.

لا تتناول ديوقام 600 مغ، قرص مغلف قابل للتجزئة في الحالات التالية :

يُنصح عاماً بعدم أخذ هذا الدواء خلال فترة الإرضاع.

يجب طلب رأي طيبك أو الصيدلي في حالة الشك.

اتخذ احتياطيات خاصة مع ديوقام 600 مغ، قرص مغلف قبل للتجزئة في الحالات التالية :

• نظرًا لوجود اللاكتوز، يجب عدم استعمال هذا الدواء في حالة الغلاكتوزيمية، متلازمة سوء امتصاص الغلاكتوز والغلاكتوز أو نقش اللاكتاز (أمراض إستقلالية نادرة).

• استشر طيبك في حالة عدم تخفيف القلق وعدم نقصان هشاشة الأوردة في طرف 15 يوماً.

• يجب استشارة طيبك إذا تواصلت الاضطرابات الباسوية بعد بضعة أيام من العلاج.

• لهذا الدواء الفاعلية الكاملة عند اتباع نظام صحي سليم،تجنب التعرض لأشعة الشمس، للحرارة، الوقوف المطول، زيادة في الوزن، السير على الأقدام، وارتداء جوارب ملائمة ييسر دوران الدم.

الحمل

لا تستعمل هذا الدواء خلال فترة الحمل إلا باستشارة طيبك.

إذا اكتشفت أنك حامل أثناء العلاج، استشيري طيبك لأنّه هو الوحيد الذي يمكنه تقدير ضرورة موافقة العلاج.

استشيري طيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

الإرضاع

نظرًا لعدم الدمام المعلومات حول مرور الدواء في حليب الأم، من المستحسن عدم استعمال هذا الدواء مدة الإرضاع.