

ANGORAL® 2 mg et 4mg

Molsidomine

Comprimé sécable

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

- La substance active est :

Molsidomine 2 mg
ou 4 mg

Les autres composants sont : silice colloïdale anhydre, lactose monohydraté, amidon de maïs, hypromellose, mannitol, stéarate de magnésium.

QU'EST-CE QUE ANGORAL, comprimé sécable ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé sécable en boîte de 30 comprimés.

Ce médicament est un antiangineux.

Angoral 2mg :

Il est indiqué dans le traitement préventif de l'angine de poitrine.

Angoral 4mg :

Il est indiqué dans le traitement de l'angine de poitrine sévère.

INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE ANGORAL, comprimé sécable :

Ne pas prendre ANGORAL, comprimé sécable dans les cas suivants :

- Hypotension artérielle importante avec état de choc.
- Association au sildénafil (VIAGRA) (médicament traitant les troubles de l'érection) :
- Si vous êtes actuellement traité par la molsidomine, le sildénafil ne doit pas être utilisé,
- En cas de traitement par sildénafil, la molsidomine ne doit pas être utilisée.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prendre des précautions particulières avec ANGORAL, comprimé sécable :

- L'association de la molsidomine au sildénafil (VIAGRA) risque de provoquer une chute importante et brutale de la pression artérielle pouvant entraîner une lipothymie (malaise passager), une syncope ou un accident cardiaque.

- En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).

- Une légère diminution de la tension artérielle est habituelle sous molsidomine. Ce médicament doit être utilisé avec précaution en cas de tension artérielle basse, ainsi que chez les sujets âgés, en cas d'hypovolémie (diminution du volume total de sang), et chez les sujets déjà traités par une substance vasodilatatrice.

- En cas d'insuffisance hépatique, il est recommandé d'augmenter la posologie de manière progressive.

Grossesse - Allaitement :

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients à effet notoire :

Lactose.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, **notamment du sildénafil (VIAGRA)**, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

COMMENT PRENDRE ANGORAL, comprimé sécable ?

Angoral 2mg :

- **Angor d'effort (posologie usuelle) :** 1/2 à 1 comprimé 3 fois par jour, en général aux repas du matin, du midi et du soir (soit 3 à 6 mg de molsidomine).

- **Angor de repos et angor d'effort sévère :** 1 comprimé 4 fois par jour (soit 8 mg de molsidomine).

Angoral 4mg :

La posologie recommandée est de 1 comprimé 3 fois par jour : dans certains cas d'angine de poitrine, la posologie peut être augmentée à 4 comprimés par jour soit 16 mg de molsidomine par jour.

La posologie quotidienne doit être répartie et ajustée en fonction de chaque cas.

Si vous avez l'impression que l'effet de ANGORAL, comprimé sécable est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Voie orale.

Si vous avez pris plus de ANGORAL, comprimé sécable que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre ANGORAL, comprimé sécable :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ANGORAL, comprimé sécable est susceptible d'avoir des effets indésirables :

- Maux de tête en début de traitement régressant spontanément en quelques jours ;
- Exceptionnellement : hypotension orthostatique (chute de la tension artérielle lors du passage à la position debout pouvant s'accompagner de vertiges), troubles digestifs, des vertiges ou démanagements.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement au centre national de pharmacovigilance - Site web :

www.pharmacovigilance.rns.tn ou directement au fabricant de ce médicament via l'adresse mail :

pharmacovigilance@pharmaghreb.com

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

COMMENT CONSERVER ANGORAL, comprimé sécable ?

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte.

Date de révision de la notice : Décembre 2023

AMM N° : Angoral 2mg : 901 363 1

Angoral 4mg : 901 363 2

CECI EST UN MÉDICAMENT

- Un médicament n'est pas un produit comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions n'est pas sans risque
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament ainsi que ses contre-indications
- Ne pas arrêter de votre propre initiative un traitement prescrit.
- Ne pas augmenter ou reprendre le traitement sans avis médical

**NE LAISSER JAMAIS
LES MÉDICAMENTS À LA PORTEE DES ENFANTS**

Version N°3/ANT30037-C



Fabriqué et distribué par les laboratoires PHARMAGHREB
BP 7-1080 Cedex TUNIS - Tél. : 71 94 03 00 - Fax : 71 94 03 09

أنقورال[®] 2 مغ و 4 مغ

موليسيدومين قرص قابل للتجزئة

كيف يتم استعمال أنقورال ، قرص قابل للتجزئة ؟

أنقورال 2 مغ :

- ذبحة الجهد (جرعة اعتيادية) : 1/2 قرص إلى قرص واحد، 3 مرات في اليوم، عموما خلال وجبة الصباح، في الظهر وفي العشاء (أي 3 إلى 6 مغ من موليسيدومين).

- ذبحة الراحة و ذبحة الجهد الحادة : قرص واحد 4 مرات في اليوم (أي 8 مغ من موليسيدومين).

أنقورال 4 مغ :

الجرعة المنصوص بها هي قرص واحد، 3 مرات في اليوم : في بعض حالات الذبحة الصدرية، يمكن الترفيع في الجرعة إلى 4 أقراص في اليوم أي 16 مغ من الموليسيدومين في اليوم.

يجب تقسيم وتعديل الجرعة اليومية حسب كل حالة.

إذا أحسست أن تأثير أنقورال، قرص قابل للتجزئة قوي جدا أو ضعيف جدا، استشر طبيبك أو الصيدلي.

عن طريق الفم.

إذا تناولت أنقورال، قرص قابل للتجزئة أكثر مما ينبغي :

استشر في الحال طبيبك أو الصيدلي.

إذا نسيت تناول أنقورال، قرص قابل للتجزئة :

لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة العادية التي نسيت أخذها.

ماهي التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة ؟

كبغية الأدوية أنقورال، قرص قابل للتجزئة، من المحتمل أن يكون له تأثيرات غير مرغوب فيها :

-أوجاع في الرأس عند بداية العلاج التي تتراجع تلقائيا بعد بضع أيام.

- استثنائيا : انخفاض ضغط الدم الوعائي (انخفاض الضغط الشرياني عند المرور إلى حالة الوقوف الذي قد يصاحبه الدوار)، اضطرابات هضمية، دوار أو حكاك.

الإبلاغ عن التأثيرات غير المرغوب فيها

إذا لاحظت وجود تأثير غير مرغوب فيه من بين التأثيرات السالفة ذكرها أو ظهور تأثيرات أخرى غير مرغوب فيها، غير مذكورة في هذه النشرة، قم بإعلام طبيبك أو الصيدلي فوراً. يمكنك أيضا الإبلاغ عن التأثيرات غير المرغوب فيها مباشرة إلى المركز الوطني لليقظة الدوائية- موقع ويب : www.pharmacovigilance.rns.tn أو مباشرة إلى مصنع هذا الدواء عن طريق البريد الإلكتروني : pharmacovigilance@pharmaghreb.com

عن طريق الإبلاغ عن التأثيرات غير المرغوب فيها، يمكنك المساعدة في توفير المزيد من المعلومات حول السلامة عند استعمال هذا الدواء.

كيف يحفظ أنقورال، قرص قابل للتجزئة ؟

يُحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 درجة.

يُحفظ بعيدا عن مرآى و متناول الأطفال.

لا يُستعمل بعد تاريخ انتهاء الصلوحية المذكورة على العلبة.

تاريخ مراجعة النشرة : ديسمبر 2023

رقم التسجيل : أنقورال 2 مغ : 901.363.1

أنقورال 4 مغ : 901.363.2

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات،
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا لتعليمات بمعرض للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- أتبع نصائح الصيدلي.
- فالطبيب والصيدلي هما الخبيران بالدواء وينبغي وضرره.
- لا تلتصق مدة العلاج المحددة لك من تلقا نفسك.
- لا تلمد ولا تزد عليها بدون إستشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

الرجاء قراءة هذه النشرة بتمعن قبل استعمال هذا الدواء.

إنها تحتوي على معلومات قيمة تخص علاجك.

إذا كانت لديك أسئلة أخرى أو شك، أطلب المزيد من المعلومات من قبل طبيبك أو الصيدلي.

هذا الدواء وُصف لك شخصيا، لا تعطه لشخص آخر حتى إذا كانت الأعراض هي نفسها، لأنه يمكن أن يسبب له أضرار.

احتفظ بهذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

المادة الفعالة هي:

موليسيدومين 2 مغ
أو 4 مغ

لقرص قابل للتجزئة.

المكونات الأخرى هي : سيليكا غرواني لا مائي، لكتوز أحادي مائي، نشا الذرة، هيبرومولوز، مانيتول، ستيراتز المنزويوم.

ما هو أنقورال، قرص قابل للتجزئة وفي أية حالة يستعمل ؟

هذا الدواء مقدم على شكل أقراص قابلة للتجزئة في علب ذات 30 قرص.
هذا الدواء هو مضاد للذبحة.

أنقورال 2 مغ :

يُستعمل في العلاج الوقائي للذبحة الصدرية.

أنقورال 4 مغ :

يُستعمل في علاج الذبحة الصدرية الحادة.

ماهي المعلومات الضرورية قبل تناول أنقورال ، قرص قابل للتجزئة ؟

لا يُستعمل أنقورال، قرص قابل للتجزئة في الحالات التالية :

-نقص الضغط الشرياني الشديد مع حالة صدمة.

-بالإشتراك مع سيلدنافيل (فيافرا) (دواء لعلاج اضطرابات الانتصاب) :

• إذا كنت تتعالج حاليا بموليسيدومين، يجب أن لا تستعمل سيلدنافيل.

• في حالة العلاج بسيلدنافيل، يجب عدم استعمال موليسيدومين.

في حالة الشك، من الضروري استشارة طبيبك أو الصيدلي.

أخذ احتياطات خاصة عند استعمال أنقورال، قرص قابل للتجزئة :

-تشريك موليسيدومين مع سيلدنافيل (فيافرا) يمكن أن ينجر عنه انخفاض شديد ومفاجئ للضغط الشرياني الذي يمكن أن يؤدي إلى تدهور الصحة (وعكة عابرة)، الإغماء أو إلى إصابة قلبية.

- لسبب وجود اللاكتوز، يجب عدم استعمال هذا الدواء في حالة الجلاكتوزيمية، متلازمة سوء امتصاص الغلوكوز والجلاكتوز أو نقص الكتاز (أمراض استقلابية نادرة الوجود).

- انخفاض خفيف للضغط الشرياني مألوف عند العلاج بموليسيدومين، يجب الاحتياط عند استعمال هذا الدواء في حالة الضغط الشرياني المنخفض، عند الأشخاص المسنين، في حالة نقص حجم الدم (انخفاض الحجم الكلي للدم)، وعند الأشخاص الذين يعالجون بمادة موسعة وعائية.

-في حالة القصور الكبدى، يُنصح بترفيف الجرعة تدريجيا.

الحمل - الإرضاع :

من الأفضل عدم استعمال هذا الدواء خلال مدة الحمل.

إذا اكتشفت أنك حامل خلال مدة العلاج، استشير طبيبك لأنه هو الوحيد الذي بإمكانه الحكم بضرورة استمرار العلاج.

يجب طلب رأي طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

قائمة السواغ ذو مفعول جدير :

لاكتوز.

أخذ أو استعمال أدوية أخرى :

الرجاء إعلام طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تستعمل أو إستعملت حديثا دواء آخر، لا سيما سيلدنافيل (الفيافرا)، حتى في حالة الحصول عليه بدون وصفة طبية.

تمويل عدد 3/ANT30037C

Pharmaghreb
Laboratoires

صنعت وتوزيع مخابر الصيدلة المغربية

ص.ب 7 تونس 1080 الهاتف : 71 94 03 00 (+216) - الفاكس : 71 94 03 09 (+216)