

CVL®+

Acide salicylique 12,5 g/100 g Solution externe pour application locale

1. QU'EST-CE QUE CVL+ 12,5 g/100 g, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : - VERRUCIDES ET CORICIDES code ATC : D11AF.

Ce médicament est une solution externe pour application locale.

Il est indiqué dans le traitement local d'appoint des cors, durillons, œil-de-perdrix et verrues.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CVL+ 12,5 g/100 g ?

N'utilisez jamais CVL+ 12,5 g/100 g dans les cas suivants :

- Allergie à l'acide salicylique ou à l'un des composants du produit contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Cors infectés

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS :

Faites attention avec CVL+ 12,5 g/100 g :

Mises en garde spéciales

En cas d'artérite, de diabète ou de neuropathie, consulter votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

En raison du risque de passage systémique, ce produit ne doit pas être appliqué sur de grande surface.

En raison de la présence d'éthanol à 96 %, ce médicament peut provoquer des irritations cutanées.

Précautions d'emploi

En cas d'échec du traitement bien conduit ou en cas de récurrence, consulter votre médecin. Il peut être utile de rechercher la cause et de la traiter en conséquence, (mesures orthopédiques de correction de l'appui, modification du chaussage).

Ne pas utiliser sur les muqueuses.

Ne pas déborder sur la peau saine.

Ce médicament contient de l'huile de ricin. Peut provoquer des réactions cutanées.

Autres médicaments et CVL+ 12,5 g/100 g, solution externe pour application locale

Si vous utilisez ou avez utilisé récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Excipients à effets notables

En raison de la présence d'éthanol à 96 %, ce médicament peut provoquer des irritations cutanées.

Ce médicament contient de l'huile de ricin. Peut provoquer des réactions cutanées.

3. COMMENT UTILISER CVL+ 12,5 g/100 g ?

Posologie

Appliquer sur la surface à traiter 1 à 2 fois par jour en veillant à ne pas déborder sur la peau saine.

Bien refermer le flacon après usage.

Laisser sécher. Au bout d'une semaine de traitement, éliminer les tissus mortifiés après avoir pris un bain de pieds chaud.

Mode et voie d'administration

Voie cutanée

Durée du traitement

En cas de cor, durillons, œil-de-perdrix : 5 à 6 jours.

En cas de verrues : 2 semaines.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne

surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Irritation de la peau en cas d'application sur la peau saine.

Risque de phénomène d'irritation locale et de sensation de brûlure.

NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

SIGNALER À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÉNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement au centre national de pharmacovigilance - Site web: www.pharmacovigilance.rns.tn ou directement au fabricant de ce médicament via l'adresse mail : pharmacovigilance@pharmaghreb.com

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER CVL+ 12,5 g/100 g ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser CVL+ 12,5 g/100 g après la date de péremption sur le conditionnement extérieur ou sur le flacon.

Bien refermer le flacon après usage.

A conserver à une température inférieure à 30°C.

A conserver maximum 15 jours après première ouverture du flacon.

Produit inflammable, à tenir éloigné de toute source de chaleur.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient CVL+ 12,5 g/100 g :

- La substance active est :

Acide salicylique 12,5 g

- Les excipients sont : collodion, huile de ricin, éthanol, éther, eau purifié.

Qu'est-ce que CVL+ 12,5 g/100 g et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de solution externe pour application locale muni d'une spatule d'application, flacon de 5 ml.

Seule la spatule d'application fournie doit être utilisée pour l'application de ce médicament.

Médicament non soumis à prescription médicale.

AMM N° : 9014111

Date de création de la notice : Juillet 2023.

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament n'est pas un produit comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions n'est pas sans risque.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament ainsi que ses contre-indications.
- Ne pas arrêter de votre propre initiative un traitement prescrit.
- Ne pas augmenter ou reprendre le traitement sans avis médical.

**NE LAISSER JAMAIS
LES MEDICAMENTS A LA PORTEE DES ENFANTS**

Version n° 1 / ANT10022-A



Fabriqué et distribué par les laboratoires PHARMAGHREB
BP 7 - 1080 Cedex TUNIS - Tél. : 71 940 300 - Fax : 71 940 309

CVL®+

حمض الساليسليك 12.5 غ / 100 غ محلول خارجي للاستعمال الموضعي

4. ماهي التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة ؟
مثل جميع الأدوية، يمكن أن يتسبب هذا الدواء في تأثيرات غير مرغوب فيها، لكنها لا تحدث بالضرورة لدى كل الأشخاص.
- تهيج الجلد في حالة الاستعمال على جلد سليم.
- خطر التهيج الموضعي والإحساس بحرق.

لا تتردد في استشارة طبيبك أو الصيدلاني.
قم بإعلام طبيبك أو الصيدلاني بأي تأثير غير مرغوب فيه ومزعج غير موجود في هذه النشرة.

الإبلاغ عن التأثيرات غير المرغوب فيها
إذا لاحظت وجود تأثير غير مرغوب فيه من بين التأثيرات السالفة ذكرها أو ظهور تأثيرات أخرى غير مرغوب فيها، غير مذكورة في هذه النشرة، قم بإعلام طبيبك أو الصيدلاني فوراً. يمكنك أيضاً الإبلاغ عن التأثيرات غير المرغوب فيها مباشرة إلى المركز الوطني لليقظة الدوائية - موقع ويب :
www.pharmacovigilance.rns.tn أو مباشرة إلى مصنع هذا الدواء عن طريق البريد الإلكتروني - عنوان البريد الإلكتروني :
pharmacovigilance@pharmaghreb.com

عن طريق الإبلاغ عن التأثيرات غير المرغوب فيها، يمكنك المساعدة في توفير المزيد من المعلومات حول السلامة عند استعمال هذا الدواء.

5. كيف يُحفظ CVL+ 12,5 غ / 100 غ ؟
يُحفظ هذا الدواء بعيداً عن مرأى و متناول الأطفال.
لا تستعمل CVL+ 12,5 غ / 100 غ بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العبوة الخارجية أو على الزجاجة.
أغلق جيداً الزجاجة بعد الاستعمال.
يُحفظ في درجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية.
يُحفظ لمدة أقصاها 15 يوماً بعد فتح الزجاجة لأول مرة.
مادة قابلة للإشتعال، تُحفظ بعيداً عن أي مصدر للحرارة.
لا تتخلص من أي أدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اطلب من الصيدلاني التخلص منها، فهذه التدابير تساعد على حماية البيئة.

6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى
ما يحتويه CVL+ 12,5 غ / 100 غ
المادة الفعالة :
حمض الساليسليك 12,5 غ
السواغ : كوليديون، زيت الخروع، إيثانول، أثير، ماء نقي.
ما هو CVL+ 12,5 غ / 100 غ وماهي محتويات العبوة الخارجية ؟
يُقدّم هذا الدواء على شكل محلول خارجي للاستعمال الموضعي مزود بأداة للتطبيق، زجاجة ذات 5 مل.
يجب استعمال الأداة المرفقة فقط لتطبيق هذا الدواء.
لا يخضع هذا الدواء إلى وصفة طبية.

رقم الترخيص : 901 411 1
تاريخ إنشاء النشرة : جويلية 2023

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات بعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- إلتزم بتعليمات الصيدلاني.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينبغيه وضروه.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تأخذ ولا تأخذ عليها بدون استشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

1. ما هو CVL+ 12,5 غ / 100 غ، وفي أي حالة يتم استعماله ؟
الفئة الصيدلانية العلاجية : كوريسيد فروسيد، رمز ATC : D11AF.
هذا الدواء هو محلول خارجي للاستعمال الموضعي.
يُشار إليه في العلاج المساعد الموضعي للقرون، للثنية، لمسامير القدم وللثآليل.

2. ما هي المعلومات التي يجب أن تعرفها قبل استعمال CVL+ 12.5 غ / 100 غ ؟

لا تستعمل أبداً CVL+ 12,5 غ / 100 غ، في الحالات التالية :
• حساسية من حمض الساليسليك أو لأي مكون من مكونات هذا الدواء المذكورة في القسم 6.

• القرون المتفتحة.

التحذيرات والاحتياطات
انتبه عند استعمال CVL+ 12,5 غ / 100 غ، في الحالات التالية :

تحذيرات خاصة

في حالة التهاب الشرايين أو مرض السكري أو الاعتلال العصبي، استشر طبيبك قبل استعمال هذا الدواء.

نظراً لخطورة مرور هذا الدواء في الدورة الدموية، لا يجب استعماله على مساحات كبيرة.

بسبب وجود الإيثانول 96%، قد يتسبب هذا الدواء في تهيجات جلدية.

احتياطات الاستعمال :
استشر طبيبك أو الصيدلاني في حالة فشل العلاج رغم تطبيقه كما يجب، أو في حالة نكسة. قد يكون من الأفضل البحث على السبب و معالجته وفقاً لذلك (إتخاذ تدابير تقويم العظام لتصحيح الإرتكاز، تغيير الحذاء).

يجب عدم استعمال هذا الدواء على الأغشية المخاطية.
لا تستعمل هذا الدواء على الجلد السليم.

يحتوي هذا الدواء على زيت الخروع، قد يؤدي إلى رد فعل تحسسي جلدي.

الأدوية الأخرى مع CVL+ 12,5 غ / 100 غ
إذا كنت تستعمل أو استعملت مؤخراً أي أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية، أخبر طبيبك أو الصيدلاني.

الحمل والرضاعة

يجب استعمال هذا الدواء بحذر أثناء الحمل والرضاعة.
بصفة عامة، يستحسن خلال مدة الحمل أو الرضاعة، طلب رأي طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.

سواغ ذات مفعول جھير
بسبب وجود الإيثانول 96%، قد يتسبب هذا الدواء في تهيجات جلدية.

يحتوي هذا الدواء على زيت الخروع، قد يؤدي إلى رد فعل تحسسي جلدي.

3. كيف يتم استعمال CVL+ 12,5 غ / 100 غ ؟
الجرعة

قم بوضعه على المكان المراد معالجته من مرة إلى مرتين في اليوم، مع الحرص على عدم وصوله إلى البشرة السليمة.

أغلق الزجاجة بإحكام بعد الاستعمال.

يترك لييجف. بعد أسبوع من العلاج، قم بإزالة الأسنجة الميتة بعد غسل

الرجلين بماء دافئ.

طريقة الاستعمال
استعمال جلدي.

مدة العلاج
في حالة القرون، الثنية و مسامير القدم : من 5 إلى 6 أيام.
في حالة الثآليل : أسبوعين.

Pharmaghreb
Laboratoires

صنع وتوزيع مخاير الصيدلة المغاربية
ص.ب 7 تونس 1080 الهاتف : 71 94 03 00 - الفاكس : 71 94 03 09