

CORICIDE VERRUCIDE®

LIQUIDE 10g/100g

1-QU'EST-CE QUE CORICIDE VERRUCIDE LIQUIDE 10 g/100 g, solution pour application cutanée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique :

- VERRUCIDES ET CORICIDES code ATC : D11AF.

Ce médicament est une solution pour application cutanée.

Il est indiqué dans le traitement local d'appoint des cors, durillons, œil-de-perdrix et verrues.

2-QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CORICIDE VERRUCIDE LIQUIDE 10 g/100 g, solution pour application cutanée ?

N'utilisez jamais CORICIDE VERRUCIDE LIQUIDE 10 g/100 g, solution pour application cutanée dans les cas suivants :

- Allergie à l'acide salicylique ou à l'un des composants du produit contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Cors infectés.

Avertissements et précautions

Faites attention avec CORICIDE VERRUCIDE LIQUIDE 10 g/100 g, solution pour application cutanée :

Mises en garde spéciales

En cas d'artérite, de diabète ou de neuropathie, consulter votre médecin avant d'utiliser ce médicament.

En raison du risque de passage systémique, ce produit ne doit pas être appliqué sur de grande surface.

En raison de la présence d'éthanol, ce médicament peut provoquer des irritations cutanées.

Précautions d'emploi

En cas d'échec du traitement bien conduit ou en cas de récédive, consulter votre médecin. Il peut être utile de rechercher la cause et de la traiter en conséquence, (mesures orthopédiques de correction de l'appui, modification du chaussage).

Ne pas utiliser sur les muqueuses.

Ne pas déborder sur la peau saine.

Ce médicament contient de l'huile de ricin. Peut provoquer des réactions cutanées.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Autres médicaments et CORICIDE VERRUCIDE LIQUIDE 10 g/100 g, solution pour application cutanée

Si vous utilisez ou avez utilisé récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients :

ETHANOL, HUILE DE RICIN.

3-COMMENT UTILISER CORICIDE VERRUCIDE LIQUIDE 10 g/100 g, solution pour application cutanée ?

Posologie

Appliquer sur la surface à traiter 1 à 2 fois par jour en veillant à ne pas déborder sur la peau saine :

Bien refermer le flacon après usage.

Laisser sécher. Au bout d'une semaine de traitement, éliminer les tissus mortifiés après avoir pris un bain de pieds chaud.

Mode et voie d'administration

Voie cutanée.

Durée du traitement

En cas de cors, durillons, œil-de-perdrix : 5 à 6 jours.

En cas de verrues : 2 semaines.

4-QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

-Irritation de la peau en cas d'application sur la peau saine.

-Risque de phénomène d'irritation locale et de sensation de brûlure.

NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

SIGNALER À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement au centre national de pharmacovigilance. Site web : www.pharmacovigilance.rns.tn ou directement aux laboratoires fabricants de ce médicament via l'adresse mail : pharmacovigilance@pharmaghreb.com

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5-COMMENT CONSERVER CORICIDE VERRUCIDE LIQUIDE 10 g/100 g, solution pour application cutanée ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser CORICIDE VERRUCIDE LIQUIDE 10 g/100 g, solution pour application cutanée après la date de péremption sur le conditionnement extérieur ou sur le flacon.

Bien refermer le flacon après usage.

Produit inflammable, à tenir éloigné de toute source de chaleur.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6-CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient CORICIDE VERRUCIDE LIQUIDE 10 g/100 g, solution pour application cutanée

Substance active

Acide salicylique 10,0 g

Excipients : collodion, huile de ricin, éthanol, éther éthylique, eau purifiée.

Pour 100 g de solution pour application locale.

Qu'est-ce que CORICIDE VERRUCIDE LIQUIDE 10 g/100 g, solution pour application cutanée et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de solution pour application cutanée muni d'un joint applicateur, flacon de 5 ml.

Seul le dispositif d'administration fourni doit être utilisé pour ce médicament.

AMM N° : 901 302 1.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE : Février 2022

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament n'est pas un produit comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions n'est pas sans risque.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament ainsi que ses contre-indications.
- Ne pas arrêter de votre propre initiative un traitement prescrit.
- Ne pas augmenter ou reprendre le traitement sans avis médical.

NE LAISSER JAMAIS

LES MEDICAMENTS A LA PORTEE DES ENFANTS

Version n° 6 / ANT10021-F



Fabriqué et distribué par les laboratoires PHARMAGHREB
BP 7 - 1080 Cedex TUNIS - Tél. : 71 940 300 - Fax : 71 940 309



كوريسيد فروسيد[®] سائل 10 غ / 100 غ

طريقة الإستعمال

إستعمال جلدي.

مدة العلاج

في حالة القرون، مسامير القدم و الثفنة : من 5 إلى 6 أيام.
في حالة الثآليل: أسبوعين.

4. ماهي التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة ؟

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يتسبب هذا الدواء في تأثيرات غير مرغوب فيها، لكنها لا تحدث بالضرورة لدى كل الأشخاص.
- تهيج الجلد في حالة الإستعمال على جلد سليم.
- خطر التهيج الموضعي و الإحساس بحرق.
لا تتردد في إستشارة طبيبك أو الصيدلاني.
قم بإعلام طبيبك أو الصيدلاني بأي تأثير غير مرغوب فيه و مزعج غير موجود في هذه النشرة.

الإبلاغ عن التأثيرات غير المرغوب فيها

إذا لاحظت وجود تأثير غير مرغوب فيه من بين التأثيرات السالف ذكرها أو ظهور تأثيرات أخرى غير مرغوب فيها، غير مذكورة في هذه النشرة، قم بإعلام طبيبك أو الصيدلي فوراً. يمكنك أيضاً الإبلاغ عن التأثيرات غير المرغوب فيها مباشرة إلى المركز الوطني لليقظة الدوائية- موقع وab : www.pharmacovigilance.rns.tn أو مباشرة إلى المخابر المختصة لهذا الدواء عن طريق البريد الإلكتروني - عنوان البريد الإلكتروني : pharmacovigilance@pharmagheb.com
عن طريق الإبلاغ عن التأثيرات غير المرغوب فيها، يمكنك المساعدة في توفير المزيد من المعلومات حول السلامة عند استعمال هذا الدواء.

5. كيف يُحفظ كوريسيد فروسيد سائل 10 غ / 100 غ، محلول للإستعمال الجلدي؟

يُحفظ هذا الدواء بعيداً عن مرأى و متناول الأطفال.
لا تستعمل كوريسيد فروسيد سائل 10 غ / 100 غ، محلول للإستعمال الجلدي بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العبوة الخارجية أو على الزجاجية.
أغلق جيداً الزجاجية بعد الإستعمال.
مادة قابلة للإشتعال، يُحفظ بعيداً عن أي مصدر للحرارة.
لا تتخلص من أي أدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اطلب من الصيدلاني التخلص منها فهذه التدابير تساعد على حماية البيئة.

6. محتوى العبوة ومعلومات أخرى

ما يحتويه كوريسيد فروسيد سائل 10 غ / 100 غ، محلول للإستعمال الجلدي

المكونات

المادة الفعالة :

حمض الساليسليك 10 غ
السواغ: كوليديون، زيت الخروع، إيثانول، أثير أيثيلي، ماء مصفى.
ل 100 غ من المحلول للإستعمال الموضعي
ماهو كوريسيد فروسيد سائل 10 غ / 100 غ، محلول للإستعمال الجلدي و ماهي محتويات العبوة الخارجية
يُقدّم هذا الدواء على شكل محلول للإستعمال الجلدي مزود بأداة للتطبيق الموضعي، زجاجة ذات 5 مل.
يجب استعمال فقط الأداة المرفقة مع هذا الدواء.

رقم التسجيل : 901 302 1

تاريخ مراجعة النشرة : فيفري 2022

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات معرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- إلتزم بصفة الصيادلة.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينبغيه وضروه.
- لاتقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لاتعد و لاتزد عليها بدون إستشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

1. ماهو كوريسيد فروسيد سائل 10 غ / 100 غ، محلول للإستعمال الجلدي و في أي حالة يستعمل؟

الفئة الصيدلانية العلاجية :

كوريسيد فروسيد، رمز ATC : D11AF.

هذا الدواء هو محلول للإستعمال الجلدي.

ينصح بإستعماله كعلاج مساعد موضعي للقرون، لمسامير القدم، للثفنة وللثآليل.

2. ما هي المعلومات التي يجب معرفتها قبل استعمال كوريسيد فروسيد سائل 10 غ / 100 غ، محلول للإستعمال الجلدي؟

لا تستعمل إطلاقاً كوريسيد فروسيد سائل 10 غ / 100 غ، محلول للإستعمال الجلدي، في الحالات التالية :

- حساسية من حمض الساليسليك أو لأي مكون من مكونات هذا الدواء المذكورة في القسم 6.
- مسامير القدم المتعفنة.

التحذيرات والاحتياطات

إنته عند إستعمال كوريسيد فروسيد سائل 10 غ / 100 غ، محلول للإستعمال الجلدي، في الحالات التالية :

تحذيرات خاصة

في حالة التهاب الشرايين أو السكري أو الاعتلال العصبي ، استشر طبيبك قبل إستعمال هذا الدواء.

نظراً لمخاطر مرور هذا الدواء في الدورة الدموية، يجب عدم إستعماله على مساحات كبيرة.

بسبب وجود الإيثانول، الإستعمال الدائم لهذا الدواء على الجلد يمكن أن يؤدي إلى تهيج وجفاف الجلد.

احتياطات الإستعمال :

استشر طبيبك أو الصيدلاني في حالة فشل العلاج رغم تطبيقه كما يجب، أو في حالة نكسة.

من الأفضل البحث على السبب و معالجته (إتخاذ تدابير تقويم العظام لتصليح الإرتكاز، تغيير الحذاء).

يجب عدم إستعمال هذا الدواء على المخاطيات.

لا تستعمل هذا الدواء على الجلد السليم .

يحتوي هذا الدواء على زيت الخروع ، قد يؤدي إلى رد فعل تحسسي جلدي. لا تتردد في إستشارة طبيبك أو الصيدلاني في حالة الشك.

الأدوية الأخرى مع كوريسيد فروسيد سائل 10 غ / 100 غ، محلول للإستعمال الجلدي،

إذا كنت تستعمل أو استعملت مؤخراً أي أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية، فأخبر طبيبك أو الصيدلاني.

الحمل والرضاعة

يجب استعمال هذا الدواء بحذر أثناء الحمل والرضاعة.
بصفة عامة، يستحسن خلال مدة الحمل أو الإرضاع، طلب رأي طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول أي دواء.

قائمة السواغ التي من الضروري معرفتها لإستعمال بدون مخاطر لدى بعض المرضى:

الإيثانول، زيت الخروع.

3. كيف يستعمل كوريسيد فروسيد سائل 10 غ / 100 غ، محلول للإستعمال الجلدي؟

الجرعة

قم بوضعه على المكان المصاب لتتم معالجته 2-1 مرات في اليوم، مع الحرص على عدم وصوله إلى البشرة السليمة:

أغلق الزجاجية بإحكام بعد الاستعمال.

يترك ليجف. بعد أسبوع من العلاج، قم بإزالة الأسجة الميتة بعد غسل الرجلين بماء دافئ.

Pharmagheb
Laboratoires

صنع وتوزيع مخابر الصيدلة المغاربية

ص.ب 7 تونس 1080 الهاتف : 71 94 03 00 - الفاكس : 71 94 03 09

Gilbert
LABORATOIRES