

HALIDOL 5 mg , comprimé

Halopéridol

1. QU'EST-CE QUE HALIDOL 5 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

HALIDOL contient une substance active appelée halopéridol. Il appartient à un groupe de médicaments appelés « antipsychotiques ».

HALIDOL est utilisé chez les adultes, les adolescents et les enfants pour traiter des maladies affectant les pensées, les sensations ou le comportement. Cela comprend des problèmes de santé mentale (tels que la schizophrénie et le trouble bipolaire) et des problèmes comportementaux.

Ces maladies peuvent provoquer chez vous :

- un état de confusion (délire)
- voir, entendre, ressentir ou sentir des choses qui ne sont pas réelles (hallucinations)
- croire des choses qui ne sont pas réelles (idées délirantes)
- une suspicion anormale (paranoïa)
- un fort sentiment d'excitation, d'agitation, d'enthousiasme, de l'impulsivité ou de l'hyperactivité
- un comportement très agressif, hostile ou violent.

Chez les adolescents et les enfants, HALIDOL est utilisé pour traiter la schizophrénie chez les patients âgés de 13 à 17 ans, et pour traiter les problèmes comportementaux chez les patients âgés de 6 à 17 ans.

HALIDOL est également utilisé :

- chez les adolescents et les enfants âgés de 10 à 17 ans et chez les adultes pour traiter les mouvements ou émissions de sons incontrôlables (tics), par exemple dans le syndrome de Gilles de la Tourette sévère
- chez les adultes, pour aider à contrôler les mouvements associés à la maladie de Huntington.

HALIDOL est parfois utilisé lorsque les autres médicaments ou traitements n'ont pas fonctionné ou ont provoqué des effets indésirables inacceptables.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE HALIDOL 5 mg, comprimé ?

Ne prenez jamais HALIDOL si :

- vous êtes allergique à l'halopéridol ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6
- votre niveau de conscience est altéré ou si vos réactions deviennent anormalement lentes ;
- vous avez une maladie de Parkinson
- vous avez un type de démence appelé « démence à corps de Lewy »
- vous avez une paralysie supranucléaire progressive (PSP)
- vous avez une maladie cardiaque appelée « allongement de l'intervalle QT » ou tout autre trouble du rythme cardiaque mis en évidence par un tracé anormal sur l'électrocardiogramme (ECG)
- vous avez une insuffisance cardiaque ou avez récemment eu une crise cardiaque.
- le taux de potassium dans votre sang est faible et que vous n'avez pas reçu de traitement pour cela
- vous prenez l'un des médicaments mentionnés dans la rubrique « Autres médicaments et HALIDOL - Ne prenez pas HALIDOL si vous prenez d'autres médicaments pour traiter ».

Ne prenez pas ce médicament si vous vous trouvez dans l'une des situations décrites ci-dessus. En cas de doute, adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre HALIDOL.

Avertissements et précautions

Effets indésirables graves

HALIDOL peut provoquer des problèmes cardiaques, des difficultés à contrôler les mouvements du corps ou des membres et un effet indésirable grave appelé « syndrome malin des neuroleptiques ». Il peut également entraîner des réactions allergiques sévères et des caillots sanguins. Vous devez avoir connaissance des effets indésirables graves possibles pendant la prise d'HALIDOL car vous pourriez avoir besoin d'un traitement médical en urgence, le cas échéant. Voir «Soyez attentif aux effets indésirables graves» dans la rubrique 4.

Personnes âgées et personnes atteintes de démence

Une légère augmentation de la mortalité et des accidents vasculaires cérébraux a été signalée chez les personnes âgées atteintes de démence prenant des antipsychotiques. Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre HALIDOL si vous êtes âgé(e), en particulier si vous souffrez de démence.

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien si vous présentez :

- un rythme cardiaque lent, une maladie cardiaque, ou si quelqu'un de votre famille proche est décédé subitement à cause de problèmes cardiaques.
- une tension artérielle basse ou des vertiges lorsque vous vous levez ou vous asseyez.
- un faible taux de potassium ou de magnésium (ou d'un autre électrolyte) dans votre sang. Votre médecin déterminera comment traiter ce problème.
- des antécédents de saignement dans le cerveau, ou si votre médecin vous a indiqué que vous risquiez plus que les autres d'avoir un AVC.
- une épilepsie ou avez déjà fait des crises épileptiques (convulsions).
- des problèmes de reins, de foie ou de thyroïde.
- un taux élevé de l'hormone appelée « prolactine » dans votre sang, ou un cancer pouvant être provoqué par des taux élevés de prolactine (comme le cancer du sein).
- des antécédents de caillots sanguins, ou si un membre de votre famille a des antécédents de caillots sanguins.
- une dépression ou si vous êtes atteint(e) de trouble bipolaire et commencez à vous sentir déprimé(e).

Vous pourriez avoir besoin d'une surveillance plus étroite et il pourrait être nécessaire de modifier la quantité d'HALIDOL que vous prenez.

Si vous n'êtes pas sûr(e) de savoir si vous êtes concerné(e) par l'une des situations ci-dessus, adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre HALIDOL.

Contrôles médicaux

Votre médecin pourra décider de réaliser un électrocardiogramme (ECG) avant ou pendant votre traitement par HALIDOL. L'ECG mesure l'activité électrique de votre cœur.

Analyses sanguines

Votre médecin pourra décider de contrôler les taux de potassium ou de magnésium (ou d'un autre électrolyte) dans votre sang avant ou pendant votre traitement par HALIDOL.

Enfants âgés de moins de 6 ans

HALIDOL ne doit pas être utilisé chez les enfants âgés de moins de 6 ans car il n'a pas été convenablement étudié chez cette classe d'âge.

Autres médicaments et HALIDOL 5 mg, comprimé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Ne prenez pas HALIDOL si vous prenez d'autres médicaments pour traiter :

- des problèmes cardiaques (comme l'amiodarone, le dofétilide, le disopyramide, la dronédarone, l'ibutilide, la quinidine et le sotalol)
- une dépression (comme le citalopram et l'escitalopram)
- une psychose (comme la fluphénazine, la lévomépromazine, la pérphénazine, le pimozide, la prochlorpérazine, la promazine, le sertindole, la thiorizadine, la trifluopérazine, la triflupromazine et la ziprasidone)
- une infection bactérienne (comme l'azithromycine, la clarithromycine, l'érythromycine, la lévofloxacine, la moxifloxacine et la télichromycine)
- une infection fongique (comme la pentamidine)
- le paludisme (comme l'halofantrine)
- les nausées et vomissements (comme le dolasetron)
- un cancer (comme le torémifène et le vandétanib).

Prévenez également votre médecin si vous prenez du bédipridil (pour des douleurs thoraciques ou pour faire baisser votre tension artérielle) ou de la méthadone (comme antidouleur ou pour traiter une toxicomanie).

Ces médicaments pourraient augmenter le risque de problèmes cardiaques ; par conséquent, si vous prenez l'un de ces médicaments, parlez-en à votre médecin et ne prenez pas HALIDOL (voir « Ne prenez pas HALIDOL si »).

Une surveillance particulière pourrait être nécessaire si vous prenez du lithium en même temps qu'HALIDOL. Prévenez immédiatement votre médecin et arrêtez de prendre les deux médicaments si vous présentez :

- une fièvre inexplicable ou des mouvements incontrôlables.
- une confusion, une désorientation, des maux de tête, des problèmes d'équilibre et des somnolences.

Ces signes indiquent une maladie grave.

Certains médicaments pourraient altérer le fonctionnement d'HALIDOL ou augmenter le risque de problèmes cardiaques.

Informez votre médecin si vous prenez :

- de l'alprazolam ou de la buspiron (pour l'anxiété).
- de la duloxétine, de la fluoxétine, de la fluvoxamine, de la néfazodone, de la paroxétine, de la sertraline, du millepertuis (Hypericum perforatum) ou de la venlafaxine (pour la dépression).
- du bupropion (pour la dépression ou l'aide à l'arrêt du tabac).
- de la carbamazépine, du phénobarbital ou de la phénytoïne (pour l'épilepsie).
- de la rifampicine (pour une infection bactérienne).
- de l'itraconazole, du posaconazole ou du voriconazole (pour une infection fongique).
- du kétoconazole en comprimés (pour traiter le syndrome de Cushing).
- de l'indinavir, du ritonavir ou du saquinavir (pour une infection par le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH).
- de la chlorpromazine ou de la prométhazine (pour des nausées et vomissements)
- du vérapamil (pour la pression artérielle ou les problèmes cardiaques).

Prévenez également votre médecin si vous prenez un autre médicament pour faire baisser votre tension artérielle, tel qu'un diurétique.

Si vous prenez l'un de ces médicaments, votre médecin devra peut-être modifier votre dose d'HALIDOL.

HALIDOL peut altérer le fonctionnement des types de médicaments suivants.

Informez votre médecin si vous prenez des médicaments pour :

- vous calmer ou vous aider à dormir (tranquillisants).
- la douleur (antalgiques puissants).
- la dépression (« antidépresseurs tricycliques »).
- faire baisser votre tension artérielle (comme la guanéthidine et la méthildopa).
- des réactions allergiques sévères (adrénaline).
- un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ou une narcolepsie (médicaments appelés «stimulants»)
- une maladie de Parkinson (comme la lévodopa).
- fluidifier le sang (phéningidone).

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre HALIDOL si vous prenez l'un de ces médicaments.

HALIDOL 5 mg, comprimé avec de l'alcool

La consommation d'alcool pendant le traitement par HALIDOL peut entraîner des somnolences et une perte de vigilance. Vous devez donc faire attention à la quantité d'alcool que vous consommez. Parlez avec votre médecin de la consommation d'alcool pendant le traitement par HALIDOL et indiquez-lui en quelle quantité vous en consommez.

Grossesse, allaitement et fertilité

Grossesse : si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin. Votre médecin pourra vous conseiller de ne pas prendre HALIDOL pendant votre grossesse.

Chez les nouveau-nés dont les mères ont pris HALIDOL pendant les 3 derniers mois de la grossesse (dernier trimestre), les problèmes suivants pourraient survenir :

- tremblements musculaires, raideur ou faiblesse des muscles
- somnolences ou agitation.
- difficultés à respirer ou à s'alimenter.

La fréquence exacte de ces problèmes n'est pas connue. Si vous avez pris HALIDOL pendant votre grossesse et que l'un de ces effets indésirables apparaît chez votre enfant, contactez votre médecin.

Allaitement : si vous allaitez ou prévoyez d'allaiter, parlez-en à votre médecin. En effet, de petites quantités du médicament pourraient passer dans le lait maternel et être absorbées par l'enfant. Votre médecin vous expliquera quels sont les risques et les bénéfices liés à l'allaitement pendant le traitement par HALIDOL.

Fertilité : HALIDOL pourrait augmenter le taux d'une hormone appelée «prolactine», ce qui pourrait altérer la fertilité masculine et féminine. Si vous avez des questions à ce sujet, adressez-vous à votre médecin.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

HALIDOL peut altérer votre aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Des effets indésirables, tel que la somnolence, peuvent altérer votre vigilance, en particulier lors de la première utilisation ou après administration d'une dose élevée. Ne conduisez pas de véhicules et n'utilisez pas d'outils ou de machines sans en avoir discuté au préalable avec votre médecin.

HALIDOL 5 mg, comprimé contient du lactose

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE HALIDOL 5 mg, comprimé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Quelle quantité devez-vous prendre ?

Votre médecin vous indiquera le nombre de comprimés à prendre et la durée du traitement. Votre médecin vous indiquera également si vous devez prendre HALIDOL en une fois ou en plusieurs prises chaque jour. Il peut falloir un certain temps pour que le médicament fasse pleinement effet. En principe, votre médecin vous prescrira d'abord une faible dose, qu'il ajustera ensuite selon vos besoins. Il est très important que vous preniez une dose adaptée.

La dose d'halopéridol que vous prendrez dépendra :

- de votre âge
- de la maladie traitée
- de l'état de vos reins ou votre foie
- des autres médicaments que vous prenez.

Adultes

- La dose sera normalement comprise entre 0,5 mg et 10 mg par jour.
- Votre médecin pourra l'ajuster de façon à trouver la dose qui vous convient le mieux.
- La dose maximale pouvant être utilisée chez l'adulte dépend de la maladie pour laquelle vous êtes traité et varie entre 5 mg et 20 mg par jour.

Personnes âgées

- En principe, les personnes âgées commenceront le traitement à 0,5 mg par jour ou avec la moitié de la plus faible dose utilisée chez l'adulte.
- La quantité d'HALIDOL à prendre sera ensuite ajustée jusqu'à ce que le médecin trouve la dose qui vous convient le mieux.

La dose maximale pouvant être utilisée chez les personnes âgées est de 5 mg par jour sauf si votre médecin décide qu'une dose supérieure est nécessaire.

Enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans

- La dose sera normalement comprise entre 0,5 mg et 3 mg par jour.
- Jusqu'à l'âge de 17 ans, les adolescents traités pour une schizophrénie ou des troubles comportementaux peuvent recevoir une dose plus élevée, pouvant aller jusqu'à 5 mg par jour.

Prise d'HALIDOL

- HALIDOL doit être administré par voie orale.
- Avez les comprimés avec de l'eau.

Si vous avez pris plus d'HALIDOL 5 mg, comprimé que vous n'auriez dû

Si vous avez pris plus d'HALIDOL que vous n'auriez dû ou si une autre personne a pris HALIDOL, contactez un médecin ou rendez-vous immédiatement aux urgences de l'hôpital le plus proche.

Si vous oubliez de prendre HALIDOL 5 mg, comprimé

- Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez la dose suivante à l'heure habituelle. Continuez ensuite le traitement comme indiqué par votre médecin.
- Ne prenez pas de dose double.

Si vous arrêtez de prendre HALIDOL 5 mg, comprimé

Sauf indication contraire de votre médecin, l'arrêt du traitement par HALIDOL doit être progressif. L'arrêt brutal du traitement pourrait entraîner des effets tels que :

- Nausées et vomissements.
- Troubles du sommeil.

Veillez à toujours suivre scrupuleusement les instructions de votre médecin.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tous le monde.

Soyez attentif aux effets indésirables graves

Informez immédiatement votre médecin si vous remarquez ou suspectez l'un des effets indésirables suivants. Vous pourriez avoir besoin d'un traitement médical en urgence.

Problèmes cardiaques :

Rythme cardiaque anormal, empêchant le cœur de fonctionner normalement et pouvant provoquer une perte de conscience. Rythme cardiaque anormalement rapide. Battements de cœur supplémentaires.

Les problèmes cardiaques sont peu fréquents chez les personnes prenant HALIDOL (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100). Des cas de mort subite se sont produits chez des patients prenant ce médicament, mais la fréquence exacte de ces décès n'est pas connue. Des arrêts cardiaques (cœur qui s'arrête de battre) se sont également produits chez des personnes prenant des antipsychotiques.

Problème grave appelé « syndrome malin des neuroleptiques », qui provoque une forte fièvre, une raideur musculaire sévère, une confusion et une perte de conscience. Sa survenue est rare chez les personnes prenant HALIDOL (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000).

Problèmes de contrôle des mouvements du corps ou des membres (syndrome extrapyramidal), notamment :

des mouvements de la bouche, de la langue, de la mâchoire et parfois des membres (dyskinésie tardive), une agitation ou des difficultés à rester assis sans bouger, une amplification des mouvements du corps. Des mouvements du corps ralentis ou réduits, des mouvements saccadés ou erratique. Un tremblement ou une raideur musculaire, un pas traînant. Une incapacité à bouger. Une expression figée du visage pouvant faire penser à un masque.

Ces problèmes sont très fréquents chez les personnes prenant HALIDOL (peuvent affecter plus d'une personne sur 10). Si vous présentez l'un de ces effets, un médicament supplémentaire pourra vous être prescrit.

Réaction allergique sévère, avec notamment :

- un gonflement du visage, des lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge. Des difficultés à avaler ou à respirer. Une éruption cutanée avec démangeaisons (urticaire).

Les réactions allergiques sont peu fréquentes chez les personnes prenant HALIDOL (peuvent affecter jusqu'à 1 personne sur 100).

Caillots sanguins dans les veines, généralement dans les jambes (thrombose veineuse profonde, TVP). Ce problème a été signalé chez des personnes prenant des antipsychotiques. Les signes d'une TVP dans la jambe comprennent un gonflement, une douleur et une rougeur au niveau de la jambe, mais le caillot peut également se déplacer vers les poumons et provoquer une douleur thoracique et des difficultés à respirer. Les caillots sanguins peuvent être très graves; vous devez donc prévenir immédiatement votre médecin si vous remarquez l'un de ces problèmes.

Informez immédiatement votre médecin si vous remarquez l'un des effets indésirables graves mentionnés ci-dessus.

Autres effets indésirables

Informez votre médecin si vous remarquez ou suspectez l'un des effets indésirables suivants.

Très fréquent (pouvant affecter plus d'une personne sur 10) :

Agitation. Troubles du sommeil. Maux de tête.

Fréquent (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :

Graves problèmes de santé mentale, comme croire des choses qui ne sont pas vraies (illusions) ou voir, ressentir, entendre ou sentir des choses qui ne sont pas réelles (hallucinations). Dépression. Tension musculaire anormale. Sensations vertigineuses, y compris en s'asseyant ou en se levant. Somnolences. Mouvement des yeux vers le haut ou mouvements yeux rapides impossibles à contrôler. Problèmes de vision, tels qu'une vision floue. Tension artérielle basse. Nausées, vomissements. Constipation. Bouche sèche ou augmentation de la production de salive. Éruption cutanée. Incapacité à uriner ou à vider complètement la vessie. Difficultés à obtenir et maintenir une érection (impuissance). Prise ou perte de poids. Modifications mises en évidence par les analyses sanguines visant à contrôler le fonctionnement du foie.

Peu fréquent (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100) :

- Effets sur les cellules sanguines – diminution de tous les types de cellules sanguines, y compris des réductions sévères des globules blancs et une diminution des plaquettes (les cellules qui aident le sang à coaguler). Confusion. Perte ou diminution du désir sexuel. Crises épileptiques (convulsions). Raideur des muscles et des articulations. Spasmes, secousses ou contractions musculaires impossibles à contrôler, y compris un spasme de la nuque faisant pencher la tête d'un côté. Troubles de la marche. Essoufflement. Inflammation du foie ou problème de foie entraînant un jaunissement de la peau ou des yeux (jaunisse). Sensibilité accrue de la peau au soleil. Démangeaisons. Transpiration excessive. Modifications du cycle menstruel (règles), telles qu'une absence de règles ou des règles prolongées, abondantes, douloureuses. Production inattendue de lait maternel. Douleur ou gêne à la poitrine. Température corporelle élevée. Gonflement dû à l'accumulation de liquide dans le corps.

Rare (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) :

Taux élevé de l'hormone appelée « prolactine » dans le sang. Rétrécissement des voies aériennes dans les poumons, entraînant des difficultés à respirer. Difficultés ou incapacité à ouvrir la bouche. Problèmes lors des rapports sexuels.

Les effets indésirables suivants ont également été signalés, mais leur fréquence exacte n'est pas connue :

Taux élevé d'hormone antidiurétique dans le sang (syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique). Faible taux de sucre dans le sang. Gonflement autour du larynx ou bref spasme des cordes vocales, pouvant entraîner des difficultés à parler ou à respirer. Défaillance soudaine du foie. Diminution du flux de bile dans les canaux biliaires. Peau qui s'écaille ou qui pèle. Inflammation des petits vaisseaux sanguins, entraînant une éruption cutanée accompagnée de petits boutons rouges ou violets. Destruction du tissu musculaire (rhabdomyolyse). Érection persistante et douloureuse du pénis. Augmentation du volume des seins chez les hommes. Température corporelle basse.

Si vous ressentez des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement au centre national de pharmacovigilance - Site web : www.pharmacovigilance.mn.tn ou directement au fabricant de ce médicament via l'adresse mail : pharmacovigilance@pharmaghreb.com En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER HALIDOL 5 mg, comprimé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser HALIDOL 5 mg, comprimé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés.

Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient HALIDOL 5 mg, comprimé ?

La substance active est :

Halopéridol 5,0 mg

Pour un comprimé.

Les autres composants sont :

hydrogénophosphate de calcium, cellulose microcristalline, amidon de riz, stéarate de magnésium, laque aluminique d'érythrosine (E127), silice colloïdale anhydre.

FORME PHARMACEUTIQUE

Boîte de 30 comprimés.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTIPSYCHOTIQUE NEUROLEPTIQUE BUTYROPHENONE

(N: Système nerveux).

Liste I – Tableau A

Date de révision de la notice : Mai 2020.

AMM N° : 901 396 1

Ceci est un médicament

- Un médicament est un produit mais pas comme les autres
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respecter rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez le conseil de votre pharmacien
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre indications
- N'arrêter pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas des doses sans consulter votre médecin.

Ne jamais laisser les médicaments à la portée des enfants

Version N° : 4 / ANT 1731-D

هاليدول[®] 5 مغ، قرص هالوبريدول

1. ماهو هاليدول 5 مغ، قرص وفي أية حالة يستعمل؟

يحتوي هاليدول على مادة فعالة تسمى بهالوبريدول. ينتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى "مضادات الذهان".

يستعمل هاليدول للبالغين، المراهقين والأطفال لعلاج الأمراض التي تؤثر على الأفكار أو المشاعر أو السلوك. كما يشمل المشاكل الصحية العقلية (مثل انقصاص الشخصية والاضطراب ثنائي القطب) و مشاكل سلوكية.

يمكن أن تسبب لك هذه الأمراض:

- حالة من الارتباك (الهذيان)
- رؤية، سماع، الإحساس أو الشعور بأشياء غير حقيقية (هلوسة)
- تصديق الأشياء غير الحقيقية (أوهام)
- اشتباه غير طبيعي (جنون العظمة)
- شعور قوي بالإثارة، الأرق، الحساس، الاندفاع أو فرط النشاط.
- سلوك عدواني جدا، عدائي أو عنيف.

عند المراهقين والأطفال، يستعمل هاليدول لعلاج مرض انقصاص الشخصية لدى المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عاما، ولعلاج المشاكل السلوكية لدى المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 17 عاما.

يستعمل هاليدول أيضا.

- لدى المراهقين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 17 سنة ولدى الكبار لعلاج الحركات التي لا يمكن السيطرة عليها أو لعلاج إحداث الأصوات غير المتحكم فيها (التشنجات اللاإرادية)، على سبيل المثال في متلازمة توريت الحادة.
- للكبار، للمساعدة في السيطرة على الحركات المرتبطة بمرض هنتغتون.
- يستعمل هاليدول في بعض الأحيان عندما تكون الأدوية أو العلاجات الأخرى غير فعالة أو تسببت في تأثيرات غير مرغوب فيها غير مقبولة.

2. ماهي المعلومات التي يجب الإحاطة بها قبل تناول هاليدول 5 مغ، قرص؟

لا تتناول إطلاقا هاليدول 5 مغ، قرص، إذا:

لديك حساسية من هالوبريدول أو لأي من المكونات الأخرى لهذا الدواء، المدرجة في فترة 6

تباطئ غير عادي في مستوى وعيك أو في ردود أفعالك ؛

- كنت تعاني من مرض الباركنسون.
- لديك نوع من الخرف يسمى "الخرف المصاحب لأجسام ليوي".
- لديك الشلل التدريجي فوق النووي (متلازمة ستيل-ريتشاردسون-أولزوسكي)
- كنت تعاني من مرض في القلب يسمى "استطالة فترة QT" أو أي اضطراب في ضربات القلب يظهره أثر غير طبيعي على تخطيط القلب.
- لديك قصور في القلب أو تعرضت مؤخرًا لنوبة قلبية.
- نسبة البوتاسيوم في دمك منخفضة ولم تتم بعلاج.
- إذا تناولت أي من الأدوية المدرجة في الفترة «**هاليدول 5 مغ، قرص والأدوية الأخرى - لا تتناول هاليدول إذا تتلقى علاج بأدوية أخرى**» .

لا تتناول هذا الدواء إذا كانت لديك أي من الحالات المذكورة أعلاه. إذا لم تكن متأكدًا، استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول هاليدول.

التحذيرات و الاحتياطات

التأثيرات غير المرغوب فيها الخطيرة

يمكن أن يسبب هاليدول مشاكل في القلب، صعوبة في التحكم في حركات الجسم أو الأطراف، وتأثير جانبي خطير يسمى "متلازمة مضادات الذهان الخبيثة". كما يمكن أن يسبب الحساسية الشديدة والجلطات الدموية. يجب أن تكون على دراية بالتأثيرات غير المرغوب فيها الخطيرة المحتملة أثناء العلاج بهاليدول حيث قد تحتاج إلى علاج طبي عاجل إذا تطلب الأمر. انظر "يجب الإنتباه إلى التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة" في القسم 4.

كبار السن والأشخاص الذين يعانون من الخرف

تم الإبلاغ عن زيادة طفيفة في الوفيات والسكتة الدماغية لدى البالغين الأكبر سنا الذين يعانون من الخرف و يتناولون مضادات الذهان. استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول هاليدول إذا كنت مسنًا، خاصة إذا كنت تعاني من الخرف.

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني إذا كان لديك:

- دقات القلب البطيئة أو أمراض القلب أو إذا توفى أحد أفراد عائلتك بشكل مفاجئ بسبب مشاكل في القلب.

انخفاض ضغط الدم أو الدوار عند الاستيقاظ أو الجلوس.

- مستوى منخفض من البوتاسيوم أو المغنيسيوم (أو إلكتروليت آخر) في دمك. سيحدد طبيبك كيفية علاج هذا التوقع الصحي.
- تعرضت سابقا لتزيف بالمشخ، أو إذا أخبرك طبيبك أنك أكثر عرضة من الآخرين للإصابة بالسكتة الدماغية.

- تعرضت سابقا لنوبات صرع (تشنجات).

- مشاكل في الكلى، الكبد أو الغدة الدرقية.
- مستوى مرتفع من هرمون يسمى "البرولاكتين" في دمك، أو السرطان الذي يمكن أن يسببه نسبة البرولاكتين العالية (مثل سرطان الثدي)
- أصبت سابقا بجلطات الدم، أو إذا كان أحد أفراد الأسرة أصيب سابقا بجلطات الدم.
- الاكتئاب أو إذا كنت تعاني من اضطراب ثنائي القطب و بدأت تشعر بالاكتئاب.

قد تحتاج إلى مزيد من المراقبة وقد تحتاج إلى تعديل جرعة هاليدول التي يجب أن تتناولها.

إذا لديك شك أنه يمكن أن تكون معني بإحدى الحالات المذكورة أعلاه، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني قبل تناول هاليدول.

الفحوصات الطبية

قد يقرر طبيبك إجراء تخطيط القلب قبل أو أثناء العلاج باستخدام هاليدول. تخطيط القلب يقيس النشاط الكهربائي للقلب.

اختبارات الدم

قد يقرر طبيبك فحص مستويات البوتاسيوم أو المغنيسيوم (أو أي ألكتروليت آخر) في دمك قبل أو أثناء علاجك بهاليدول

الأطفال دون سن 6 سنوات

لا ينبغي أن يستعمل هاليدول لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات لأنه لم تتم دراسته بالقدر الكافي لدى هذه الفئة العمرية.

هاليدول 5 مغ، قرص و الأدوية الأخرى

قم بإعلام طبيبك أو الصيدلاني إذا كنت تتناول، أوتناولت مؤخرا أو قد تتناول أي أدوية أخرى.

• مشاكل القلب (مثل الأميودارون، الدوفيتيليد، الديسوبراميد، الدرونيدارون، الإيبوتيليد، الكينيدين والسوتالول)

لا تتناول هاليدول إذا كنت تتلقى علاج بأدوية أخرى،

- الاكتئاب (مثل سيتالوبرام وإسكيتوبرام)
- الذهان (مثل فلوفينازين، ليفومبرومازين، بيرفينازين، بيموزيد، بروكلوبريرازين، برومازين، سيرتيندول، تيزوريدين، تلافيلوبرمازين، تلافيلوبرومازين وزيبراسيدون).
- التشنجات البكترية (مثل أزيتروميسين، كلاريثروميسين، إريثروميسين، ليفوفلوكلكساسين، موكسيفلوكساسين وفيلتروميسين)
- التشنجات الفطرية (مثل البنيتاميدين)
- الغلاني (مثل الهالوفانترين)
- الغثيان والتقيؤ (مثل الدوليسسترون)
- السرطان (مثل تورميفين وفاندانينيب).

قم بإعلام طبيبك أيضا إذا كنت تتناول بيبريديل (لعلاج آلام الصدر أو لتخفيض ضغط الدم) أو ميتادون (كمسكن للألم أو لعلاج إدمان المخدرات).

هذه الأدوية قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. لذلك، إذا كنت تتناول أيا من هذه الأدوية،قم بإعلام طبيبك ولا تتناول هاليدول (انظر "لا تتناول هاليدول إذا").

قد تكون المراقبة الخاصة ضرورية إذا كنت تتناول الليثيوم بالتزامن مع الهاليدول. أخبر طبيبك على الفور وتوقف عن تناول كلا الدوائين إذا كان لديك؛

• حمى لا يمكن تفسيرها أو حركات لا يمكن السيطرة عليها.

• الارتباك، وفقدان التوازن، والصداع، ومشاكل التوازن والنعاس.

هذه العلامات تشير إلى مرض خطير.

قد تؤثر بعض الأدوية على طريقة عمل هاليدول أو تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

قم بإعلام طبيبك إذا كنت تأخذ:

- أبيرازولام أو بوسبيرون (لعلاج القلق).
- دولوكستين، فلوكستين، فلوفاكسامين، نيفازودون، باروكستين، سيرترالين، نبتة العرن المنقوب (نبتة القديس يوحنا المثقبة) أو فلافواكسين (لعلاج الاكتئاب).
- بوبروبيون (لعلاج الاكتئاب أو فضاؤل التركيز عن التدخين).
- كاربامازيبين، الفينوباربيتال أو الفينيتوين (لعلاج الصرع).
- ريفامبيسين (للعوى البكتيرية).
- إيتراكونازول أو بوساكونازول أو فوركونازول (التعفن الفطري).
- قرص الكيتوكونازول (لعلاج متلازمة كوشينغ)
- إندينافير أو ريتونافير أو ساكوينافير (لعلاج المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، VIH).
- كلوربرومازين أو بروميتازين (للغثيان والتقيؤ)
- فيراباميل (لضغط الدم أو مشاكل في القلب).

قم بإعلام طبيبك أيضا إذا كنت تتناول دواء آخر لحفض ضغط الدم، مثل مدر للبول.

إذا كنت تتناول أي من هذه الأدوية، فقد يحتاج طبيبك إلى تعديل جرعة هاليدول.

قد يؤثر هاليدول على كيفية عمل الأنواع التالية من الأدوية.

قم بإعلام طبيبك إذا كنت تتناول الأدوية من أجل:

- تهدئتك أو تساعدك على النوم (المهدئات).
- ألم (مسكنات الألم القوية).
- الاكتئاب («مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات»)
- لحفض ضغط الدم (مثل غوانيثيدين و ميتلدوبا).
- التفاعلات التحسسية الحادة (الأدريثالين).
- اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD) أوألنوم القهري (أدوية تسمى «المنشطات»)
- مرض باركنسون (مثل ليفودوبا).
- مضادات تخثر الدم (فيننديبوني).

تحدث إلى طبيبك قبل تناول هاليدول إذا كنت تتناول أي من هذه الأدوية.

هاليدول 5 مغ، قرص مع الكحول

يمكن أن يسبب شرب الكحول أثناء تناول هاليدول النعاس وفقدان اليقظة. لذلك عليك أن تكون حذرا بشأن كمية الكحول التي تستهلكها. استشر طبيبك حول شرب الكحول أثناء تناول هاليدول و قم بتحديد كمية الكحول التي تستهلكها.

الحمى، الإرضاع و الخصوبة

الحمى: إذا كنت حاملا، تعقدين أنك قد تكونين حاملا أو تخططين لإنجاب طفل، فاطلبي نصيحة الطبيب. قد ينصحك بعدم تناول هاليدول أثناء فترة الحمل.

بالنسبة للمواليد الجدد الذين تناولت أمهاتهم هاليدول خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل (الثلاثية الأخيرة)، يمكن أن تحدث التكررات التالية:

• الارتجاج العضلي، تصلب أو ضعف في العضلات.

• النعاس أو الأرق.

• صعوبة في التنفس أو الأكل.

التواتر الدقيق لهذه المشاكل غير معروف. إذا كنت قد تناولت هاليدول أثناء الحمل وظهرت أي من هذه

التأثيرات غير المرغوب فيها لدى طفلك، اتصلي بطبيبك.

الإرضاع: قم بإعلام طبيبك إذا كنت ترضعين طفلك أو تخططين للرضاعة الطبيعية. وذلك لأن كميات صغيرة من الدواء قد تنتقل إلى حليب الثدي ويتم امتصاصه من قبل الطفل. سيشرح طبيبك مخاطر وفوائد الرضاعة الطبيعية أثناء تناول هاليدول.

والخصوبة: يمكن أن يزيد هاليدول مستوى هرمون يسمى "البرولاكتين"، مما قد يؤثر على خصوبة الذكور والإناث. اسأل طبيبك إذا كان لديك أي أسئلة.

القيادة و استخدام الآلات

قد يؤثر هاليدول على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات. التأثيرات غير المرغوب فيها، مثل النعاس، يمكن أن تؤثر على اليقظة، خاصة عند استخدامها لأول مرة أو بعد تناول جرعة عالية. و لا تقم بقيادة السيارة و لا تقم باستخدام أي أدوات أو آلات دون إستشارة طبيبك.

يجتوي هاليدول 5 مغ، قرص على الاككتور

إذا أخبرك طبيبك أنك لا تتحمل بعض السكريات، استشره قبل تناول هذا الدواء.

3. كيف تتناول هاليدول 5 مغ، قرص

تناول هذا الدواء دائما تماما حسب توجيهات الطبيب أو الصيدلاني. استشرهما في حالة الشك.

ماهي الجرعة التي يجب تناولها؟

سيخبرك طبيبك بكمية الأقراص هاليدول ومدة العلاج - سيخبرك أيضا إذا يجب عليك أن تتناول هاليدول مرة واحدة أو عدة مرات في اليوم. قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق الفاعلية التامة للدواء. من حيث المبدأ، سوف يصف طبيبك أولا جرعة منخفضة، ويقوم بتعديلها وفقا لاحتياجك. من المهم جدا أن تتناول الجرعة المناسبة.

تعتمد جرعة هالوبريدول التي تتناولها على:

- السن.
- المرض الذي يجري علاجه.
- حالة الكلى أو الكبد.
- الأدوية الأخرى التي تتناولها.

البالغين

• عادة ما تكون الجرعة بين 0.5 مغ و 10 مغ في اليوم.

• يمكن لطبيبك تعديل الجرعة حسب الحالة المناسبة.

• تعتمد الجرعة القصوى التي يمكن استخدامها عند الكبار على المرض الذي تتم معالجته وتتراوح من 5 مغ إلى 20 مغ في اليوم.

الأشخاص السنين

• من حيث المبدأ، يبدأ المسنون العلاج عند 0.5 مغ في اليوم أو نصف أقل جرعة التي يتناولها الكبار.

• سيتم بعد ذلك تعديل جرعة هاليدول التي يجب أخذها حتى يجد الطبيب الجرعة المناسبة لك.

• إذا كنت نسيبت للجرعة التي يمكن يتناولها كبار السن هو 5 مغ في اليوم ما لم يقرر طبيبك أن هناك حاجة لجرعة أعلى.

الأطفال والمراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 17 سنة

• عادة ما تكون الجرعة بين 0.5 مغ و 3 مغ في اليوم.

• حتى سن 17 عاما، قد يحصل المراهقون الذين عولجوا من مرض انقصاص الشخصية أو الإضطرابات السلوكية على جرعة أعلى، تصل إلى 5 مغ في اليوم.

استعمال هاليدول

يجب أن يتناول هاليدول عن طريق الفم.

• قم بابتلاع القرص باماء.

إذا كنت تتناول هاليدول 5 مغ، قرص أكثر مما يجب

إذا كنت تتناول هاليدول أكثر مما يجب أو تناول شخص آخر هاليدول ، اتصل بالطبيب أو اذهب إلى أقرب كاد نسيبتالي في المستشفى على الفور.

إذا نسيبت تناول هاليدول 5 مغ، قرص

• إذا نسيبت تناول جرعة، تناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد. ثم تابع العلاج وفقا لتوجيهات الطبيب.

لا تأخذ جرعة مضاعفة.

إذا توقفت عن تناول هاليدول 5 مغ، قرص

إذا توقفت عن تناول هاليدول 5 مغ، قرص

ما لم يتم توجيه الطبيب بخلاف ذلك، يجب أن يكون وقف العلاج باستعمال هاليدول تدريجيا. يمكن أن يسبب توقف العلاج فجأة تأثيرات مثل:

- الغثيان والتقيؤ
- اضطرابات النوم

اتبع دائما تعليمات الطبيب بعناية.

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استعمال هذا الدواء ، اسأل طبيبك أو الصيدلاني مزيد من المعلومات.

4. ما هي التأثيرات غير المرغوب فيها المحتملة؟

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء تأثيرات غير المرغوب فيها، لكنها لا تحصل بالضرورة لدى كل الأشخاص.

يجب الانتباه إلى التأثيرات غير المرغوب فيها الخطيرة

قم بإعلام طبيبك على الفور إذا لاحظت أو شككت في أي من التأثيرات غير المرغوب فيها التالية. قد تحتاج إلى علاج طبي طارئ.

مشاكل القلب:

- نبض قلبي غير طبيعي وهو ما يمنع القلب من العمل بشكل طبيعي و يمكن أن يتسبب في فقدان الوعي.
- تسارع غير عادي في ضربات القلب.نبضات قلبية إضافية.

تكون مشاكل القلب غير شائعة لدى الأشخاص الذين يتناولون هاليدول (قد يصيب شخص واحد من بين 100 شخص). كما حدثت حالات موت مفاجئة لدى لمرضى الذين يلقون علاج بهذا الدواء،لكن التواتر الدقيق لهذا هذا الوفايات غير معروف. كما حدثت حالات السكتة القلبية (القلب الذي يتوقف عن النبض) بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون مضادات الذهان.

مشكلة خطيرة تسمى "متلازمة مضادات الذهان الخبيثة" التي تسبب ارتفاع في درجة الحرارة،تصلب العضلات الشديد،الارتباك وفقدان الوعي. حدوث هذه الأعراض لدى عند الأشخاص الذين يتناولون هاليدول يبقى نادر (قد يؤثر على شخص واحد من كل 1000 شخص).

مشاكل السيطرة على حركات الجسم أو الأطراف (متلازمة خارج السبيل الهرمي)، بما في ذلك:

- حركات الفم و اللسان والفك وأحيانا الأطراف (خلل الحركة المتأخر).

• هيجان أو صعوبة الجلوس بدون حركة - زيادة حركة الجسم.تباطئ أو تناقص في حركات الجسم.رعاش أو تصلب العضلات، خطوة متثاقلة أو ساجية.عدم القدرة على التحرك.تعبير ثابت على الوجه يذكر بالفتاع، إمكانية حدوث هذه الأعراض الشائعة جدا لدى الأشخاص الذين يتناولون هاليدول (قد تحدث لدى أكثر من شخص من كل 10 أشخاص). إذا واجهت أيا من هذه التأثيرات، فقد يوصف لك دواء إضافي.

رد فعل تحسسي شديد، بما في ذلك:

• تورم في الوجه، الشفتين، الفم، اللسان أو الحلق،صعوبة في البلع أو التنفس.طفح جلدي حكة (الشرى).
ردود الفعل التحسسية غير شائعة لدى الأشخاص الذين يتناولون هاليدول (قد تحدث لدى ما يصل إلى 1 من كل 100 شخص)

تختثر الدم في الأوردة، وعادة في الساقين (الخثار الوريدي العميق، DVT) تم الإبلاغ عن هذه المشكلة لدى الأشخاص الذين يتناولون مضادات الذهان. تشمل علامات الإصابة بجلطات الأوردة العميقة في الساق تورم وآلم واحمرار في الساق، لكن الجلطة يمكن أن تنتقل أيضا إلى الرئتين، مما تسبب في ألم في الصدر وصعوبة في التنفس.
جلطات الدم يمكن أن تكون خطيرة جدا. لذلك يجب أن تخبر طبيبك على الفور إذا لاحظت أي من هذه المشاكل.

قم بإعلام طبيبك على الفور إذا لاحظت أي من التأثيرات غير المرغوب فيها الخطيرة المذكورة أعلاه .

التأثيرات غير المرغوب فيها أخرى

قم بإعلام طبيبك إذا لاحظت أو شككت في أي من التأثيرات غير المرغوب فيها التالية.

شائع جدا (قد تحدث لدى أكثر من شخص من كل 10 أشخاص) :

- هيجان. اضطرابات في النوم. الصداع.

شائع (قد تحدث لدى إلى حدود شخص واحد من كل 10 أشخاص) :

مشاكل خطيرة في الصحة العقلية، مثل تصديق أشياء غير حقيقية (أوهام)، رؤية أو سماع أو الشعور بأشياء غير حقيقية (هلوسة).
كآبة. شد عضلي غير طبيعي.
الدوار، بما في ذلك عند الجلوس أو الاستيقاظ.
نعاس. حركة العين إلى الأعلى أو حركات العين سريعة من المستحيل السيطرة عليها.
مشاكل في الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية.انخفاض ضغط الدم. الغثيان والتقيؤ. الإسهال.
خفاف الفم أو زيادة إنتاج اللعاب.
طفح جلدي.عدم القدرة على التبول أو إفراغ المثانة تماما.
صعوبة الحصول على الانتصاب والحفاظ عليه (العجز الجنسي).
زيادة الوزن أو الخسارة.
التغيرات التي تم كشفها من خلال تحليل لمراقبة وظيفة الكبد.

غير مألوف (قد يؤثر على شخص واحد من بين كل 100 شخص) :

• التأثيرات على خلايا الدم – انخفاض في جميع أنواع خلايا الدم، بما في ذلك انخفاض حاد في خلايا الدم البيضاء وانخفاض في الصفائح الدموية (الخلايا التي تساعد على تخرثر الدم)

• ارتباك.فقدان أو نقصان في الرغبة الجنسية.
نوبات الصرع (التشنجات).
تصلب العضلات والمفاصل.

• التشنجات أو اهتزاز أو الوخز في العضلات التي لا يمكن السيطرة عليها، بما في ذلك تشنج الرقبة الذي يؤدي إلى إمالة الرأس إلى جانب واحد.اضطرابات في المشي.ضيق التنفس.

التهاب الكبد أو إشكال في الكبد التي تسبب اصفرار الجلد أو العينين (اليرقان).
زيادة حساسية الجلد للشمس.الحكة.الترقق المفرط.تغيير في الدورة الشهرية، مثل غياب الدورة الشهرية أو دورة شهرية مطولة.

إفراز الحليب من الثدي بصفة غير منتظمة.آلم في الصدر أو عدم الراحة.ارتفاع درجة حرارة الجسم.تورم بسبب تراكم السوائل في الجسم.

نادر (تحدث لدى شخص واحد من كل 1000 شخص) :

ارتفاع مستوى هرمون يسمى البرولاكتين في الدم.إنكماش في الشعب الهوائية في الرئتين، مما يسبب صعوبة في التنفس.صعوبة أو عدم القدرة على فتح فم.
مشاكل أثناء الجماع.

تم أيضا الإبلاغ عن التأثيرات غير المرغوب فيها التالية، لكن ذات تردد دقيق غير معروف :
ارتفاع مستوى هرمون المضاد لإدرار البول في الدم (متلازمة إفراز غير مناسب للهرمون المضاد لإدرار البول).
انخفاض نسبة السكر في الدم.تورم حول الحنجرة أو تشنج قصير في الحبال الصوتية، مما قد يسبب صعوبة في التحدث أو التنفس.فقرم كبدي مفاجئ.انخفاض تدفق الصفراء في القنوات الصفراوية.
تشقير الجلد.التهاب الأغشية الدموية الصغيرة، مما تسبب في طفح جلدي مصحوب ببثور حمراء أو أرجوانية صغيرة.تدمير الأنسجة العضلية (انحلال الريدات).
إنتصاب مطول ومؤلم.ارتفاع حجم الثدي عند الرجال.انخفاض درجة حرارة الجسم.

إذا واجهت أي التأثيرات غير مذكورة في هذه النشرة و إذا أصبحت هذه التأثيرات خطيرة، فيرجى إخبار طبيبك أو الصيدلاني.

الإبلاغ عن تأثيرات غير مرغوب فيها

إذا لاحظت وجود تأثير غير مرغوب فيه من بين التأثيرات السالف ذكرها أو ظهور تأثيرات أخرى غير مرغوب فيها، غير مذكورة في هذه النشرة، قم بإعلام طبيبك أو الصيدلي فورًا. يمكنك أيضا الإبلاغ عن التأثيرات غير المرغوب فيها مباشرة إلى المركز الوطني لليقظة الدوائية- موقع واب :

www.pharmacovigilance.rns.tn أو مباشرة إلى مصنع هذا الدواء عن طريق البريد الإلكتروني – عنوان البريد الإلكتروني: pharmacovigilance@pharmaghreb.com

عن طريق الإبلاغ عن التأثيرات غير المرغوب فيها، يمكنك المساعدة في توفير المزيد من المعلومات حول السلامة عند استعمال هذا الدواء.

5. كيف يحفظ هاليدول 5 مغ، قرص؟

يجب الحفاظ على هذا الدواء بعيدا عن مرأى و متناول الأطفال.

لا يستعمل هاليدول بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المسجل على القنينة والعلمية.

تاريخ انتهاء الصلوحية يوافق آخر يوم في الشهر.

لا ترمي الأدوية في قنوات الصرف الصحي أو في القمامة المنزلية، أطلب من الصيدلاني التخلّص من الأدوية التي لم تعد بحاجتها. تساعد هذه التدابير في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

ماذا يحتوي هاليدول 5 مغ، قرص؟

هالوبريدول.....5 مغ
لقرص واحد.

المكونات الأخرى : هيدروجينوفوسفات الكلسيوم، سلّوز ميكروكريستاليني، نشا الأرز، ستيرات المغنيزيوم، إريثروزين (E127)، سيلكا غروية لامائية.

الشكل الصيدلي

علبة ذات 30 قرص

التصنيف الصيدلي العلاجي :

مضادات الذهان البوتيروفينوثات (الجهاز العصبي)

قائمة I – جدول أ

تاريخ مراجعة النشرة : ماي 2020

رخصة عدد: 901 396 1

إن هذا دواء
- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات. - الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر. - إنّه بصفة وصفة طبية، وطريقة الإستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك، - أنت بصالح الصيدلاني. - فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء وينبغي وضرره. - لا تقطع مدة العلاج المحدّدة لك من لقاء نفسك. - لا تعد ولا ترد عليها بدون إستشارة الطبيب.
لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال