

# Perozyl® 1%

Nitrate d'éconazole  
Emulsion fluide  
Pour application locale

## IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### COMPOSITION

Formule pour 100 g :

Nitrate d'éconazole ..... 1 g  
Excipients : stéarates d'éthyléneglycol et de macrogols 300 et 1500, paraffine liquide, glycérides polyglycolysés insaturés, silice colloïdale anhydre, butylhydroxyanisole (E320), acide benzoïque (E210), parfum, eau purifiée.

### FORME PHARMACEUTIQUE

Emulsion fluide pour application locale, flacon de 30 ml.

### CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTIFONGIQUE LOCAL (D : Dermatologie).

### DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est préconisé dans le traitement ou le traitement d'appoint de certaines affections cutanées dues à des champignons (mycoses).

### ATTENTION!

#### DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE

#### MEDICAMENT?

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas d'allergie à l'un des composants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Eviter l'application près des yeux.
- Il est recommandé de ne pas utiliser un savon acide (l'acidité favorisant la multiplication de candida).
- En cas d'application chez l'enfant, sur une grande surface, ou sur une peau lésée, respecter impérativement les recommandations et la posologie indiquée par votre médecin en raison de la pénétration plus importante du produit dans ces circonstances.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES

#### INTERACTIONS :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

#### GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

### LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE

#### POUR UNE UTILISATION SANS

#### RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS :

Acide benzoïque (E210), butylhydroxyanisole (E320)

### COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

#### POSOLOGIE :

Appliquer sur les régions atteintes et leur périphérie 2 fois par jour, après toilette et séchage de la peau.

Faire suivre l'application d'un massage doux et régulier jusqu'à pénétration complète.

### MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

VOIE CUTANEE.

#### Agiter avant l'emploi.

Instructions pour ouvrir le flacon :

Le flacon se présente avec un bouchon et doit être ouvert comme suit :



Ouvrir le bouchon en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

### DUREE DU TRAITEMENT :

La durée du traitement est de 2 à 4 semaines selon la mycose, elle peut être plus longue pour certaines localisations. L'utilisation régulière du produit pendant toute la durée du traitement est déterminante pour la réussite du traitement.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DU MEDECIN.

### EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS :

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS : démangeaisons, irritation, sensation de brûlure, rougeurs et dans de très rares cas, des réactions allergiques à type d'eczéma ont été observées : IL FAUT EN AVERTIR VOTRE MEDECIN. SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

### CONSERVATION :

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

Date de révision de la notice : juin 2018.

### AMM N° :

#### CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ces contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas la dose sans consulter votre médecin.

#### NE LAISSEZ JAMAIS LES MEDICAMENTS A LA PORTEE DES ENFANTS

*Fabriqué et distribué par les laboratoires PHARMAGHREB  
BP 7 - 1080 Cedex TUNIS - Tél. : 71 94 03 00 - Fax : 71 94 03 09*

