

# SOLFICINE® 5 mg et 10 mg

Succinate de solifénacine  
Comprimés pelliculés

## 1. QU'EST-CE QUE SOLFICINE, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST - IL UTILISE ?

**Classe pharmacothérapeutique :** Médicaments urologiques, médicaments de l'incontinence urinaire - code ATC : G04BD08. La solifénacine (substance active de SOLFICINE) appartient à la classe pharmacothérapeutique des anticholinergiques. Ces médicaments sont utilisés pour réduire les contractions de la vessie lorsque celle-ci est hyperactive. Ceci vous permettra d'attendre plus longtemps avant de devoir aller aux toilettes et augmentera le volume des urines que peut retenir votre vessie.

### Indications thérapeutiques

Traitements symptomatiques de l'incontinence urinaire par impérisséité et/ou de la pollakiurie et de l'impérisséité urinaire pouvant s'observer chez les patients souffrant d'hyperactivité vésicale.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SOLFICINE, comprimé pelliculé ?

### Contre-indications

#### Ne prenez jamais SOLFICINE, comprimé pelliculé :

- Si vous avez des difficultés pour uriner ou si votre vessie ne se vide pas complètement quand vous urinez (réention urinaire).
- Si vous souffrez d'une affection gastro-intestinale grave (notamment un mégacôlon toxique, complication associée à la rectocolite hémorragique).
- Si vous souffrez d'une maladie des muscles appelée myasthénie, caractérisée par une faiblesse musculaire excessive.
- Si vous souffrez d'une augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil, avec perte progressive de la vision (glaucome).
- Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes hémodialysé.
- Si vous souffrez d'une maladie sévère du foie.

Prévenez votre médecin avant le début du traitement par SOLFICINE, comprimé pelliculé si vous présentez ou avez déjà présenté l'une des maladies mentionnées ci-dessus.

### Avertissements et précautions

#### Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre SOLFICINE, comprimé pelliculé.

- Si votre vessie ne se vide pas complètement quand vous urinez (obstruction des voies urinaires) ou si vous avez des difficultés pour uriner (par exemple un faible volume d'urine). Le risque d'accumulation d'urine dans la vessie (réention urinaire) est alors beaucoup plus élevé.
- Si vous avez une obstruction gastro-intestinale (constipation).
- Si vous avez un risque de ralentissement de la motilité gastro-intestinale (ralentissement de la circulation des matières solides et liquides dans le tube digestif).

Si c'est le cas, votre médecin vous en aura informé ;

- Si vous souffrez d'une maladie rénale sévère.
- Si vous souffrez d'une maladie modérée du foie.

· Si vous avez une hernie hiatale ou des brûlures d'estomac.

· Si vous avez une atteinte neurologique (neuropathie autonome).

· L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

### Enfants et adolescents

SOLFICINE, comprimé pelliculé ne doit pas être utilisé chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans.

Prévenez votre médecin avant le début du traitement par SOLFICINE, comprimé pelliculé si vous présentez ou avez déjà présenté l'une des maladies mentionnées ci-dessus.

Avant le début du traitement par SOLFICINE, comprimé pelliculé, votre médecin évaluera si votre pollakiurie (envie fréquente d'uriner) a d'autres causes [par exemple une insuffisance cardiaque (capacité de pompage du cœur insuffisante) ou une maladie du rein]. Si vous avez une infection urinaire, votre médecin vous prescrira un antibiotique (traitement contre certaines infections bactériennes).

### Interactions avec d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Il est particulièrement important que vous préveniez votre médecin si vous prenez :

- d'autres médicaments anticholinergiques, car les effets et les effets indésirables des deux médicaments peuvent être accentués.
- des médicaments cholinergiques, car ils peuvent réduire l'effet de SOLFICINE, comprimé pelliculé .
- des médicaments tels que le métoclopramide ou le cisapride, qui accélèrent le fonctionnement du tube digestif. SOLFICINE, comprimé pelliculé peut réduire les effets de ces médicaments.
- des médicaments tels que le kétoconazole, le ritonavir, le nelfinavir, l'itraconazole, le vérapamil ou le diltiazem, qui ralentissent la dégradation de SOLFICINE, comprimé pelliculé dans l'organisme.
- des médicaments tels que la rifampicine, la phénytoïne ou la carbamazépine, car ils peuvent accélérer la dégradation de SOLFICINE, comprimé pelliculé dans l'organisme.
- des médicaments tels que les bisphosphonates, qui peuvent déclencher ou aggraver une oesophagite (inflammation de l'œsophage).

### Interactions avec les aliments et les boissons

SOLFICINE, comprimé pelliculé peut être pris indifféremment pendant ou en dehors des repas.

### Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Il n'est pas recommandé d'utiliser SOLFICINE, comprimé pelliculé pendant la grossesse, sauf nécessité absolue.

N'utilisez pas SOLFICINE, comprimé pelliculé si vous allaitez car la solifénacine pourrait passer dans le lait maternel.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

SOLFICINE, comprimé pelliculé peut provoquer une vision trouble et parfois une somnolence ou une fatigue. Si vous souffrez de l'un de ces effets indésirables, ne conduisez pas et n'utilisez pas de machine.

### Excipients à effet notable

SOLFICINE, comprimé pelliculé contient du lactose. Si votre médecin vous a informé que vous présentez une maladie héréditaire rare tel qu'une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose-galactose, vous ne devez pas utiliser ce médicament.

## 3. COMMENT PRENDRE SOLFICINE, comprimé pelliculé ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

**Mode d'administration :** voie orale. Avaler le comprimé en entier avec du liquide. Il peut être pris indifféremment, pendant ou en dehors des repas. Ne pas croquer le comprimé.

**Posologie :** La dose habituelle est de 5 mg par jour, sauf si votre médecin vous demande de prendre 10 mg par jour.

### Si vous avez pris plus de SOLFICINE, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

En cas de prise excessive ou en cas de prise accidentelle par un

enfant, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. Un surdosage peut se manifester par les symptômes suivants: maux de tête, sécheresse de la bouche, sensations vertigineuses, somnolence et vision trouble, perception de choses qui n'existent pas (hallucinations), excitation importante, convulsions, difficultés à respirer, accélération du rythme cardiaque (tachycardie), accumulation d'urine dans la vessie (réention urinaire) et dilatation de la pupille (mydriase).

### Si vous oubliez de prendre SOLFICINE, comprimé pelliculé :

Si vous oubliez de prendre un comprimé à l'heure habituelle, prenez-le dès que possible, sauf s'il est déjà l'heure de la prise de la dose suivante. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

### Si vous arrêtez de prendre SOLFICINE, comprimé pelliculé :

Si vous arrêtez de prendre SOLFICINE, vos symptômes d'hyperactivité vésicale pourraient réapparaître ou s'aggraver. Consultez toujours votre médecin si vous envisagez d'arrêter le traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous faites un choc allergique, ou une réaction cutanée sévère (par exemple décollement de la peau et formation de bulles), vous devez en informer votre médecin ou votre pharmacien immédiatement. Un angioédème (réaction allergique cutanée qui se traduit par un gonflement survenant dans le tissu juste sous la surface de la peau) avec obstruction des voies respiratoires (difficulté à respirer) a été rapporté chez quelques patients traités par succinate de solifénacine (SOLFICINE). En cas de survenue d'un angioédème, le succinate de solifénacine (SOLFICINE) doit être immédiatement arrêté et un traitement et/ou des mesures appropriées doivent être prises. SOLFICINE, comprimé pelliculé peut provoquer les autres effets indésirables suivants :

### Très fréquents (peut affecter plus de 1 personne sur 10)

- sécheresse de la bouche.

### Fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

- vision trouble.

- constipation, nausées, indigestion avec des symptômes tels que lourdeur abdominale, douleur abdominale, régurgitations, nausées et brûlures d'estomac (dyspepsie), gêne au niveau de l'estomac.

### Peu fréquents (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

- infection urinaire, infection de la vessie.

- somnolence.

- perturbation du goût (dysgueusie).

- sécheresse (irritation) des yeux.

- sécheresse du nez.

- reflux gastro-oesophagien.

- sécheresse de la gorge.

- sécheresse de la peau.

- difficultés pour uriner.

- fatigue.

- accumulation de liquide dans les jambes (œdème).

### Rares (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000)

- accumulation d'une grande quantité de matières fécales dans le gros intestin (fécalome).

- accumulation d'urine dans la vessie par impossibilité de vider la vessie (réention urinaire).

- sensations vertigineuses, maux de tête.

- vomissements.

- démangeaisons, rash.

### Très rares (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000)

- hallucinations, confusion.

- éruption cutanée allergique.

### Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles)

- diminution de l'appétit, niveaux élevés de potassium dans le sang qui peuvent causer des anomalies du rythme cardiaque

- augmentation de la pression intraoculaire

- modifications de l'activité électrique du cœur (ECG), battements cardiaques irréguliers, perception de vos battements cardiaques, accélération du rythme cardiaque

- troubles de la voix

- troubles hépatiques

- faiblesse musculaire

- troubles rénaux

### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement au centre national de pharmacovigilance - Site web : [www.pharmacovigilance.rns.tn](http://www.pharmacovigilance.rns.tn) ou directement au fabricant de ce médicament via l'adresse mail : [pharmacovigilance@pharmaghreb.com](mailto:pharmacovigilance@pharmaghreb.com)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. COMMENT CONSERVER SOLFICINE, comprimé pelliculé ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

### Conditions de conservation

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### Que contient SOLFICINE, comprimé pelliculé ?

**La substance active est :**

Succinate de Solifénacine ..... 5 mg

Équivalent à Solifénacine ..... 3,8 mg

OU :

Succinate de Solifénacine ..... 10 mg

Équivalent à Solifénacine ..... 7,5 mg

**Les autres composants sont :** Lactose monohydraté, hypromellose, amidon de maïs, stéarate de magnésium, dioxyde de titane, polyéthylène glycol, talc, oxyde de fer jaune non irradié, oxyde de fer rouge non irradié pour Cp à 10 mg.

### Qu'est-ce que SOLFICINE, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur ?

Les comprimés de SOLFICINE sont conditionnés en plaquettes thermoformées contenues dans des boîtes de 30 comprimés.

### Liste II – Tableau C

Date de création de la notice : Février 2024

AMM n° :

SOLFICINE 5mg, comprimé pelliculé boîte de 30 : 901 413 1

SOLFICINE 10mg, comprimé pelliculé boîte de 30 : 901 413 2

### Ceci est un médicament

- Un médicament est un produit mais pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordon

# سولفيسين® 5 مغ و 10 مغ

سكسينات السولفيسين

قرص ملبيس

غير شائعة (قد تظهر لدى 1 من كل 100 شخص)

عدوى المسالك البولية، التهاب المثانة.

الناعم.

اضطراب النوم (خلل النوم).

خفاف (تبونج) العينين.

الارتجاع المعدى المريئي.

خفاف الحلق.

خفاف الجلد.

صعوبة النبول.

الإرهاق.

تراركم السوائل في الساقين (وذمة).

نادرة (قد تظهر لدى 1 من كل 1000 شخص)

تراركم كمية كبيرة من البراز في الأمعاء الغليظة (الحصبة البرازية).

تراركم البول في المثانة بسبب عدم القدرة على تفريغ المثانة (احتباس البول).

الدوخة والصداع.

القيء.

حكة، تفعج جلدي.

نادرة جداً (قد تظهر لدى 1 من بين 10000 شخص)

الهلوسة، التشوش.

طفح جلدي تحسسي.

ذات تواتر غير محدد (لا يمكن تقديره بناء على البيانات المماثلة)

نقص الشهية وارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم مما قد يؤدي إلى عدم انتظام دقات القلب.

زيادة الضغط داخل العين.

تغيرات في النشاط الكهربائي للقلب (تحطيط كهربائية القلب)، عدم انتظام دقات القلب، إدراك دقات

القلب، زيادة معدل دقات القلب.

اضطرابات في الصوت.

اضطرابات في الكبد.

ضعف عضلي.

اضطرابات الكل.

الإبلاغ عن التأثيرات غير مرغوب فيها

إذا لاحظت وجود تأثير غير مرغوب فيه من بين التأثيرات المألوفة ذكرها أو ظهر تأثيرات أخرى غير مرغوب فيها، غير مذكورة في هذه النشرة، قم بإعلام طبيبك أو الصيدلي فوراً. يمكنك أيضاً الإبلاغ عن التأثيرات غير المرغوب فيها مباشرة إلى المركز الوطني للقيقة الدوائية موقع واب: [www.pharmacovigilance.ms.tn](http://www.pharmacovigilance.ms.tn)

الإلكترونوني - غونان البريد الإلكتروني: [pharmacovigilance@pharmaghreb.com](mailto:pharmacovigilance@pharmaghreb.com)

عن طريق الإبلاغ عن التأثيرات غير المرغوب فيها، يمكنك المساعدة في توفير المزيد من المعلومات حول السلامة عند استعمال هذا الدواء.

5. كيف يتم حفظ سولفيسين، قرص ملبيس؟

يجب حفظ هذا الدواء بعيداً عن مرايا ومتناول الأطفال.

لا تستعمل هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العلبة والشريط. يشير تاريخ انتهاء

شروطحفظ

لا يتطلب هذا الدواء أي شروط حفظ خاصة.

6. معلومات إضافية

على ماذا يحتوي سولفيسين، قرص ملبيس؟

بالنسبة لمحض ملبيس:

المادة الفعالة هي:

سولفيسين سكسينات.....

أي ما يعادل سولفيسين.....

او:

سولفيسين سكسينات.....

أي ما يعادل سولفيسين.....

المكونات الأخرى هي: موتوهيدرات الالكترون، هيدروكسي بروبيل ميغيل سيلولوز، نشا النزرة، سبيروات

المغنيسيوم، ثانوي أكسيد الستيبات، بولي إيثيلين جايكول، الثالك، أكسيد الحديد الأصفر غير المشع،

أكسيد الحديد الأحمر غير المشع لقرص 10 مغ.

ما هو سولفيسين، قرص ملبيس وما هي محتويات العبوة الخارجية؟

يتم تعبئة أقراص سولفيسين في أشرطة موجودة في علب تحتوي على 30 قرصاً.

قائمة II جدول

تاريخ تناول النشرة: فيفري 2024

رقم الترخيص:

سولفيسين 5 مغ، قرص ملبيس، علبة ذي 30 قرصاً 1

سولفيسين 10 مغ، قرص ملبيس، علبة ذي 30 قرصاً 2



صنع وتوزيع مخابر الصيدلانية المغربية

ص 7 - 1080 سيدك تونس

الهاتف: 216 71 940 300 - الفاكس: 309

**للتراكم الأدوية في متناول أيدي الأطفال**

1. ما هو سولفيسين، قرص ملبيس وما هي دواعي استعماله؟

الفئة العلاجية الصيدلانية: أدوية سلس البول، أدوية سلس البول - مز ATC : G04BD08.

يتضمن السولفيسين (المادة الفعالة لسولفيسين) إلى فئة العلاج الصيدلاني لمضادات الكولين. تستعمل

هذه الأدوية لتقليل تقلصات المثانة عندما تكون المثانة مفرطة التنشاط. سيسهم لك ذلك بالانتظار لفترة

أطول قبل الاضطرار إلى الذهاب إلى الحمام وسيزيد من حجم البول الذي يمكن أن تحمله المثانة.

الدواعي العلاجية: علاج اعراض سلس البول الالاحي / أو التكرار البولي وإلحاد البول الذين يمكن ملاحظتهم لدى

المرضى الذين يعانون من فرط نشاط المثانة.

2. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل تناول سولفيسين، قرص ملبيس؟

موانع الاستعمال: لا تتناول أبداً سولفيسين، قرص ملبيس:

إذا كنت تواجه مسحية في التبول أو إذا كانت مثانتك لا تفرغ تماماً عند التبول (احتباس البول).

إذا كنت تعاني من اضطراب معدى معي خظير (بما في ذلك تضخم القولون السُّمِّي)، وهو من

المضاعفات المصاحبة لاضطراب القولون القثيقي).

إذا كنت تعاني من مرض عضلي يسمى الوهن العضلي الوبيل، والذي يتضمن ضعف عضلي مفرط.

إذا كنت تعاني من زيادة الضغط داخل العين، مع فقدان تدريجي للرؤية (الغلوكوما).

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه المادة الفعالة أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (المدرجة في

القسم 6).

إذا كنت تعاني من مرض كبيبي الكل.

إذا كنت تعاني من مرض كبيبي معتدل وكانت تتناول أدوية قد تبطئ من

التخلص من سولفيسين من الجسم (مثل الكينوكنازول). إذا كان الأمر كذلك، فسيلاجك طبيبك أو

أخبر طبيبك قبل بدء العلاج بسولفيسين، قرص ملبيس إذا كان لديك أو سبق أن عانيت من أي من

الأمراض المذكورة أعلاه.

التحذيرات والاحتياطات: تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول سولفيسين، قرص ملبيس.

إذا كانت مثانتك لا تفرغ تماماً عند التبول (احتباس البول) أو إذا كنت تعاني من صعوبة في

التبول (مثل اخفاض حجم البول). عندئذ يكون خطر تراكم البول في المثانة (احتباس البول) أعلى من

ذلك بكثير.

إذا كنت تعاني من انسداد معدى معي (امساك).

إذا كنت معرضاً لخطر إبطاء حركة الجهاز الهضمي (بطء دوران المواد الصلبة والسائلة في الجهاز

الهضمي)، إذا كان الأمر كذلك، فسوف يخبرك طبيبك بذلك.

إذا كان لديك مرض حاد في الكل.

إذا كان لديك مرض كبيبي معتدل.

إذا كان لديك فتق حابي أو حرقه في المعدة.

إذا كان لديك ضرر عصبي (الاعتلال العصبي الالارادي).

لا ينصح باستخدام هذا الدواء لدى المرضى الذين يعانون من عدم تحمل الجالاكتوز، نقص اللاكتاز،

سوء امتصاص الجلوكوز أو الجالاكتوز (أمراض وراثية نادرة).

لا ينبعي استخدام سولفيسين، قرص ملبيس لدى الأطفال والمرأهقين الذين تقل عمرهم عن 18 عاماً.

أخبر طبيبك قبل بدء العلاج بسولفيسين، قرص ملبيس إذا كان لديك أو سبق أن عانيت من أي من

الأمراض المذكورة أعلاه.

قبل بدء العلاج باستخدام سولفيسين، قرص ملبيس إذا كانت التردد البولي لديك (الرغبة

المتكررة في التبول) لها أسباب أخرى [على سبيل المثال قصور القلب (نقص قدرة القلب على الصباغ)

أو أمراض الكلية]. إذا كنت مصاباً بعوائق العهداء طبيبك، فسيصف لك طبيبك مضاداً حيوياً (الاعلاج

لبعض أنواع العوادى الكبيرة).

إذا كنت تتناول أو تتناول مؤخراً أي دواعي أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها بدون

وصفة طبية، فقد تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي.

من المهم بشكل خاص أن تخبر طبيبك إذا كنت تتناول:

أدوية أخرى ضادة للكولين، حيث قد تزداد حدة التأثيرات والتأثيرات الجانبية لكل الدواعين.

الأدوية الكريانية، لأنها يمكن أن تقلل من تأثير سولفيسين، قرص ملبيس.

الأدوية مثل ميتوكوربراميد أو سيساربيد، التي تسرع عمل الجهاز الهضمي. قد يقل سولفيسين، قرص

ملبيس، من تأثيرات هذه الأدوية.

الأدوية مثل ريفامبيسين، فينيتوبيون أو كاربامازيبين، حيث يمكنها تسرع تحمل سولفيسين، قرص

ملبيس، في الجسم.

الأدوية مثل بيفوسفونات، والتي يمكن أن تؤدي إلى التهاب المريء أو تناوله.

يمكن تناول سولفيسين، قرص ملبيس إما أثناء الوجبات أو خارجها.

الحمل والرضاعة: إذا كنت حاملاً أو مرضعة، أو تعتقدين أنك حامل أو تخططين لإنجاب طفل، استشيري طبيبك أو

الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

لا يوصى باستخدام سولفيسين، قرص ملبيس إذا كنت مرضعة لأن سولفيسين يمكن أن ينتقل إلى حليب الثدي.

استشيري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

التأثيرات على القدرة على القيادة واستخدام الألات:

قد يسبب سولفيسين، قرص ملبيس، عدم وضوح الرؤية وأحياناً النعاس أو الإرهاق. إذا كنت تعاني من

سواء ذات مفعول جهير

بحتى القرص المليون سولفيسين على الالكترون. إذا أخبرتك طبيبك أن لديك مرضًا ورأيتها نادراً مثل

عدم تحمل الجالاكتوز، نقص اللاكتاز أو سوء امتصاص الجلوكوز وـ الجالاكتوز، فلا يجب عليك

استعمال هذا الدواء.

3. كيف يتم تناول سولفيسين، قرص ملبيس؟

احرص دائمًا على تناول هذا الدواء تماماً كما أخبرك طبيبك. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك

طريقة الاستعمال: عن طريق الفم. ابتلع القرص كاملاً مع سائل. يمكن تناوله أثناء الوجبات أو خارجها.

لا تقم بمضغ القرص.

الجرعة: الجرعة المعتادة هي 5 مغ في اليوم، إلا إذا طلب منك طبيبك تناول 10 مغ في اليوم.

إذا تناولت سولفيسين، قرص ملبيس أكثر مما تبغض:

في حالة الإفراط في تناوله أو في حالة تناوله من قبل طفل عن طريق الخطأ، استشر طبيبك أو الصيدلي

على الفور.

قد تظهر الأعراض التالية للجرعة الزائدة: صداع، جفاف الفم، دوار، نعاس وتشوش الرؤية، إدراك

أشياء غير موجودة (الهلوسة)، الشعور بالإثارة الشديدة، تشنجات، صعوبة في التنفس، زيادة معدل

دقات القلب (تسريع القلب)، تراكم البول في المثانة (احتباس البول) واتساع حدقتي العين.

إذا نسيت تناول سولفيسين، قرص ملبيس:

إذا نسيت تناول القرص في الوقت المعتاد، فتناوله في أقرب وقت ممكن، إلا إذا كان الوقت قد

لجر عنك التالية. لا تتناول جرعة مضاعفة لتعزيز جرعة التي نسيت تناولها. إذا كان لديك شكل