

TORRAL® LP 400 mg

Pentoxifylline

1. QU'EST-CE QUE TORRAL LP 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique
VASODILATATEUR PERIPHERIQUE.

Indications thérapeutiques

- Traitement symptomatique de la claudication intermittente des artériopathies chroniques oblitérantes des membres inférieurs (au stade 2).
- Traitement d'appoint à visée symptomatique du déficit pathologique cognitif et neuro-sensoriel chronique du sujet âgé (à l'exclusion de la maladie d'Alzheimer et des autres démences).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TORRAL LP 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sures, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Contre-indications

Ne prenez jamais TORRAL LP 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée dans les cas suivants :

- si vous êtes allergique à la pentoxifylline ou à l'un des composants du comprimé ;
- si vous êtes en phase aiguë de l'infarctus du myocarde ;
- lorsqu'une hémorragie est en cours ou s'il existe un risque hémorragique majeur.

Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé, sauf avis contraire de votre médecin, pendant la grossesse et l'allaitement.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec TORRAL LP 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée :

Précautions d'emploi

Ce médicament peut augmenter les risques de saignements dans certaines situations :

- en cas de chirurgie récente, ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution, ou de maladie grave du foie,
- en cas d'association à un médicament destiné à éviter la formation de caillot dans un vaisseau : traitement anticoagulant, traitement antiagrégant plaquettaire (tel que l'aspirine),
- en cas de diabète (une surveillance ophtalmologique est nécessaire).

Suivez rigoureusement les conseils de votre médecin en matière de surveillance et prévenez-le de l'apparition du moindre saignement.

Si vous avez des antécédents d'hypotension artérielle ou si vous prenez un médicament pour l'hypertension artérielle, faites surveiller plus souvent votre tension artérielle.

Ce médicament est éliminé par les reins, signalez à votre médecin vos antécédents rénaux et urinaires.

Ce médicament doit également être utilisé avec précaution si vous souffrez d'angine de poitrine sévère.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Ce médicament est principalement utilisé chez le sujet âgé pour lequel le risque de grossesse est absent. La pentoxifylline et ses métabolites passent dans le lait maternel.

Par conséquent, son utilisation est déconseillée pendant la grossesse et l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

3. COMMENT PRENDRE TORRAL LP 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée ?

Posologie

La posologie usuelle est de 1 à 3 comprimés par jour.

Chez l'insuffisant rénal, la posologie maximale est de 2 comprimés par jour.

Mode d'administration

Voie orale.

Avaler le comprimé sans le croquer, avec un peu d'eau.

Prendre le comprimé de préférence au cours du repas.

Durée de traitement

Se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de TORRAL LP 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée que vous n'auriez dû :

En cas d'absorption massive, prévenir immédiatement un médecin.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez de prendre TORRAL LP 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée:

Prenez la dose suivante à l'heure habituelle; ne doublez pas la dose.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, TORRAL LP 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- troubles digestifs : nausées, vomissements, brûlures gastriques, diarrhée. Prenez le médicament au cours des repas pour éviter ces effets,
- accès de rougeur du visage, chute de tension, accélération du rythme cardiaque, maux de tête, vertiges, insomnie, agitation,
- éruption cutanée, démangeaisons ou réactions allergiques,
- réactions allergiques généralisées (brusque chute de la pression artérielle, brusque gonflement du visage et du cou et gêne respiratoire) ont été rapportés,

• augmentation du risque de saignement surtout en cas de prise concomitante de médicament destiné à éviter la formation de caillot dans un vaisseau,

- anomalies rares de certaines constantes biologiques dans le sang : taux anormalement bas de plaquettes (éléments du sang importants dans la coagulation sanguine),
- cholestase (diminution de sécrétion de la bile),

• la membrane du comprimé peut être retrouvée dans les selles, • ménigrites aseptiques (sans origine infectieuse déterminée) ont été rapportées, nécessitant l'arrêt du traitement.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne sera pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement au centre national de pharmacovigilance - Site web: www.pharmacovigilance.rns.tn ou directement au fabricant de ce médicament via l'adresse mail : pharmacovigilance@pharmaghreb.com

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER TORRAL LP 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser TORRAL LP 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient TORRAL LP 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée ?

COMPOSITION

Par comprimé

Pentoxifylline (DCl) 400 mg

Les autres composants sont :

Excipients : Methocel, povidone, talc, stéarate de magnésium.

Emboîtement : sépiïlm blanc 752, propylène glycol 6000.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que TORRAL LP 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée et contenu de l'emballage extérieur ?

FORMES ET PRÉSENTATIONS

Comprimés enrobés à libération prolongée à 400 mg modèle hospitalier : Boîte de 400.

LISTE II

AMM N° : 901 379 2H

Date de révision de la notice : Juin 2023

Ceci est un médicament

- Un médicament est un produit mais pas comme les autres

- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.

- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi que l'a posé à prescrit.

- Suivez le conseil de votre pharmacien

- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre indications.

- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.

- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Ne jamais laisser les médicaments à la portée des enfants

Version N° : 3 / ANT10903-C



Fabriqué et distribué par les laboratoires PHARMAGREB
BP 7 - 1080 Cedex TUNIS - Tél. : (+216) 71 94 03 00 - Fax : (+216) 71 94 03 09

توريال[®] مفعول مطول 400 مغ

بِنْتُوكَسِيفَلِين

تحويل عدد / ٣ CANT10903

Pharmaghreb

REFERENCES

1 - (+
2/3)